

Mensajes para las redes sociales sobre los brotes de tos convulsa

Publicaciones de Facebook

Para mujeres embarazadas

Obtenga más información sobre la tosferina, una enfermedad que puede ser mortal para los bebés. Todas las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna Tdap durante el tercer trimestre de cada embarazo para proteger a sus bebés. Obtenga más información: <https://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=8635414>

Para el público general

¿Qué es la tosferina y cómo puede prevenirse? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dan respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la tosferina:

<https://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs.html>.

Dato rápido sobre la tosferina: En inglés, a la tosferina o tos convulsa se le llama “whooping cough” debido al chillido que se emite cuando la persona intenta recuperar al aliento después de un ataque de tos. ¿Desea obtener más información? Consulte los datos rápidos sobre la tos convulsa: <https://www.cdc.gov/pertussis/fast-facts.html>.

La forma más eficaz de prevenir la tosferina es a través de las vacunas DTaP para bebés y niños y la vacuna Tdap para preadolescentes, adolescentes y adultos. ¿Desea obtener más información? Consulte los datos rápidos sobre la tos convulsa:

<https://www.cdc.gov/pertussis/fast-facts.html>.

Los ataques de tos provocados por la infección de la tos convulsa pueden durar 10 semanas o más. A esta enfermedad a veces se le conoce como “la tos de los 100 días”. ¿Desea obtener más información? Consulte los datos rápidos sobre la tos convulsa: <https://www.cdc.gov/pertussis/fast-facts.html>

Publicaciones de Twitter

Para mujeres embarazadas

No se arriesgue a contagiarle la #tosferina a su bebé. Vacúnese.

<https://www.cdc.gov/pertussis/pregnant/mom/get-vaccinated.html>

Ayude a proteger a los bebés contra la #tosferina. Cree un círculo de protección: vacúnese. <https://www.cdc.gov/Features/pertussis/>

Para los padres, no hay una alegría más grande que ver a sus hijos crecer sanos y felices. Mamá, #vacúnate.

<https://www.cdc.gov/pertussis/pregnant/mom/get-vaccinated.html>

Para el público general

Dos vacunas ayudan a prevenir la tosferina: DTaP y Tdap. Los niños menores de 7 años reciben la DTaP y niños mayores y adultos, la Tdap.

<https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/pertussis/index.html>

Los síntomas de la tosferina aparecen de 1 a 3 semanas después de exponerse; si ha estado cerca de alguien con tosferina y se siente enfermo/a, ¡vea a su médico!

<https://www.cdc.gov/pertussis/about/signs-symptoms.html>

¡Las personas con tosferina son contagiosas por hasta 3 semanas! Asegúrese de tener la vacuna Tdap. <https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/pertussis/index.html>

¿Quiere aprender más sobre la tos convulsa? Visite la página web de preguntas frecuentes de CDC: <https://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs.html>

Incluso si ha tenido tosferina antes, necesita vacunarse.

<https://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs.html>

La tos convulsa se transmite fácilmente de persona a persona a través de la tos y los estornudos. Una persona puede infectar a más de una docena de personas.

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html