



# Mga booster na dosis, ikatlong dosis para sa immunocompromised

*(Na-update noong 01-11-2022)*

Para sa pinakabagong impormasyon, bisitahin ang <https://govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid-19-vaccine>

## Inirerekomenda na booster na dosis

Lahat ng tatlong bakuna sa COVID-19 ay makukuha din bilang booster na dosis para sa ganap na nabakunahang mga tao sa mga grupong nakalista sa ibaba. Maaaring piliin ng mga tao kung aling bakuna ang kukunin bilang booster at maaaring makakuha ng booster na dosis sa karamihan ng mga lokasyong nagbibigay ng mga bakunang para sa COVID-19.

Bakuna	Inirerekomenda para sa mga sumusunod na grupo ng mga tao	Tamang oras
<b>Pfizer</b> Unang dosis 0.3 mL Pangalawang dosis 0.3 mL Booster na dosis 0.3 mL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 taong gulang at pataas</li> <li>• Inirerekomenda na ngayon ang booster na dosis para sa mga taong edad na <b>12</b> at pataas na immunocompromised at nakatanggap na ng pangatlong dosis.</li> </ul>	Booster na dosis nang hindi bababa sa limang buwan pagkatapos ng pangalawang dosis
<b>Moderna</b> Unang dosis 0.5 mL Pangalawang dosis 0.5 mL Booster na dosis 0.25 mL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 taong gulang at pataas</li> <li>• Inirerekomenda na ngayon ang booster na dosis para sa mga taong edad 18 at pataas na immunocompromised at nakatanggap ng pangatlong dosis.</li> </ul>	Booster na dosis nang hindi bababa sa limang buwan pagkatapos ng pangalawang dosis
<b>Johnson &amp; Johnson</b> Unang dosis 0.5 mL Booster na dosis 0.5 mL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 taong gulang at pataas</li> <li>• Inirerekomenda na ngayon ang booster na dosis para sa mga taong edad 18 at pataas na immunocompromised at nakatanggap ng bakuna na Johnson &amp; Johnson.</li> </ul>	Inirerekomenda ang booster na dosis nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng unang dosis

## Ikatlong dosis para sa immunocompromised

Kung ikaw ay immunocompromised, dapat kang makakuha ng ikatlong dosis ng bakuna sa mRNA na bakuna nang hindi bababa sa 28 araw pagkatapos ng iyong pangalawang dosis.

Bakuna	Inirerekomenda para sa mga sumusunod na grupo ng mga tao	Tamang oras
<b>Pfizer</b> <b>12+</b> Unang dosis 0.3 mL Pangalawang dosis 0.3 mL Pangatlong dosis 0.3 mL  Dosis na pambata para sa mga 5–11 taong gulang Unang dosis 0.2 mL Pangalawang dosis 0.2 mL Pangatlong dosis 0.2 mL	Mga taong edad 5 at mas mataas na <a href="#">katamtaman hanggang sa malubha na immunocompromised</a> na lalong mahina laban sa COVID-19.	Hindi bababa sa 28 araw pagkatapos ng pangalawang dosis
<b>Moderna</b> Unang dosis 0.5 mL Pangalawang dosis 0.5 mL Pangatlong dosis 0.5 mL	Mga taong <a href="#">katamtaman hanggang sa malubha na immunocompromised</a> na lalong mahina laban sa COVID-19.	Hindi bababa sa 28 araw pagkatapos ng pangalawang dosis
<b>Johnson &amp; Johnson</b>	Lahat ng nakatanggap ng pagbabakuna sa Johnson & Johnson ay mahigpit na pinapayuhan na kumuha ng booster na dosis na alinman sa tatlong awtorisadong bakuna dalawang buwan pagkatapos ng kanilang dosis ng Johnson & Johnson.	N/A

**Kakayanang mai-access ng dokumento:** Para sa mga indibidwal na may mga kapansanan o mga indibidwal na nagsasalita ng ibang wika bukod sa Ingles, makapagbibigay ang OHA ng impormasyon sa mga alternatibong anyo tulad ng mga pagsasalin, malaking print, o braille. Makipag-ugnay sa COVID-19 Communications Unit at 1-971-673-2411, 711 TTY o [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.o.sa](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.o.sa) amin