

Mga Dosis ng Bakuna para sa COVID-19

COVID-19 na Bakuna	Unang dosis	Pangalawang dosis	Pangatlong dosis	Karagdagang dosis ¹ (para lang sa nakompromiso ang resistensya)	Mga booster na dosis ²
Moderna na monovalent na pangunahing serye sa bata (6 na buwan–5 taon)	0.25 mL (Madilim na asul ang takip, magenta ang border ng label)	0.25 mL	N/A	0.25 mL	N/A
Pfizer na monovalent na pangunahing serye sa bata (6 na buwan–4 na taon)	0.2 mL (Maroon ang takip)	0.2 mL	0.2 mL	N/A	N/A
Pfizer na pangunahing serye sa bata (edad 5–11)	0.2 mL (Orange ang takip)	0.2 mL	N/A	0.2 mL	0.2 mL
Moderna na monovalent na pangunahing serye sa bata (edad 6–11)	0.5 mL (madilim na asul ang takip, teal o kulay ube ang border ng label)	0.5 mL	N/A	0.5 mL	N/A
Pfizer na bivalent na booster na dosis (edad 5–11)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2 mL (orange ang takip, orange ang border ng label)
Moderna na bivalent na booster na dosis (6–11)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.5 mL (madilim na asul ang takip, abuhin ang border ng label)
Pfizer na monovalent na pangunahing dosis (edad 12+)	0.3 mL (Abuhin ang takip)	0.3 mL	N/A	0.3 mL	Ang pormulasyon na ito ay hindi awtorisado bilang booster na dosis; tingnan ang mga

					opsyon sa ibaba sa bivalent na booster
Moderna na monovalent na pangunahing dosis (edad 12+)	0.5 mL (Pula ang takip, mapusyaw na asul ang border ng label)	0.5 mL	N/A	0.5 mL	Ang pormulasyon na ito ay hindi awtorisado bilang booster na dosis; tingnan ang mga opsyon sa ibaba sa bivalent na booster.
Pfizer bivalent na booster na dosis (edad 12+)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3 mL (Abuhin ang takip)
Moderna na bivalent na booster na dosis (edad 12+)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.5 mL (madilim na asul ang takip, abuhin ang border ng label)
Johnson & Johnson (edad 18+)	0.5 mL	N/A	N/A	Tingnan ang tala sa ibaba	Tingnan ang tala sa ibaba
Novavax³ (edad 12+)	0.5 mL	0.5 mL	N/A	N/A	N/A

Tandaan: Ang mga taong nakompromiso ang resistensya na tumanggap ng Johnson & Johnson na bakuna ay dapat tumanggap ng karagdagang dosis ng isang monovalent (orihinal na pormula ng bakuna) na mRNA na bakuna (Pfizer o Moderna) nang kahit 28 araw pagkaraan ng kanilang unang dosis. Pagkatapos ay isang booster na dosis ng bivalent (na-update na pormula ng bakuna) na mRNA na bakuna kahit dalawang buwan pagkatapos ng kanilang karagdagang dosis O kahit dalawang buwan pagkatapos ng kanilang pinakabagong monovalent na booster na dosis.

¹ Inirerekomenda ng CDC na ang mga taong nakompromiso ang resistensya at tumanggap ng Pfizer (5+) o Moderna (6 na buwan+) ay kumuha ng karagdagang (monovalent) na dosis kahit 28 araw pagkaraan ng kanilang pangalawang dosis. Ang karagdagang mga dosis para sa mga taong nakompromiso ang resistensya ay bahagi ng pangunahing serye ng bakuna. Hindi inirerekomenda sa panahong ito ang karagdagang dosis ng Pfizer na bakuna para sa mga batang 6 na buwan hanggang 4 na taon ang edad.

² Inirerekomenda ng CDC na ang lahat ng edad 5 at mas matanda na nakatanggap ng Pfizer o Moderna, at 18 at pataas na tumanggap ng Johnson & Johnson, ay kumuha ng bivalent na Moderna o Pfizer na booster na dosis kapag kwalipikado sila—ibig sabihin, kahit 2 buwan pagkatapos makumpleto ang pangunahing serye (kabilang ang mga karagdagang dosis gaya ng ipinahiwatig para sa mga taong nakompromiso ang resistensya) o 2 buwan pagkatapos matanggap ang pinakabagong monovalent na booster na dosis.

³ Hindi inirerekomenda sa kasalukuyan ang mga karagdagang dosis para sa mga taong nakompromiso ang resistensya para sa mga nakatanggap ng bakunang Novavax.

Kahandaang ma-access ng dokumento: Para sa mga indibidwal na may mga kapansanan o mga indibidwal na nagsasalita ng ibang wika bukod sa Ingles, makapagbibigay ang OHA ng impormasyon sa mga alternatibong anyo tulad ng mga pagsasalin, malaking print, o braille. Makipag-ugnayan sa Yunit ng Komunikasyon para sa COVID-19 sa 971-673-2411, 711 TTY o sa COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us