



Mga Dosis ng COVID-19 na Bakuna

COVID-19 na Bakuna	Unang dosis	Ikalawang dosis	Pangatlong dosis* (para sa immunocompromised lamang)	Booster na dosis*
Pfizer pediatric (May edad na 5–11)	0.2 mL	0.2 mL	0.2 mL	Hindi inirerekomenda ng FDA o CDC
Pfizer (May edad na 12+)	0.3 mL	0.3 mL	0.3 mL	0.3 mL (para sa mga taong may edad na 12+, limang buwan pagkatapos ng pangalawang dosis)
Moderna (May edad na 18+)	0.5 mL	0.5 mL	0.5 mL	0.25 mL (para sa mga taong may edad na 18+, limang buwan pagkatapos ng pangalawang dosis)
Janssen (J&J; May edad na 18+)	0.5 mL		Hindi inirerekomenda ng FDA o CDC	0.5 mL (para sa mga may edad na 18+, dalawang buwan pagkatapos ng unang dosis)

* Inirerekomenda ng CDC na ang lahat ng may edad na 12 at mas matanda ay nakakatanggap ng booster dosis kapag kwalipikado sila: limang buwan pagkatapos ng kanilang pangalawang dosis ng bakuna ng Pfizer o Moderna, o dalawang buwan pagkatapos ng dosis ng bakuna ng Janssen (Johnson & Johnson). Kabilang dito ang mga taong immunocompromised at nakatanggap ng ikatlong dosis ng Pfizer o Moderna.

Kahandaang maakses ng dokumento: Para sa mga indibidwal na may mga kapansanan o mga indibidwal na nagsasalita ng ibang wika bukod sa Ingles, makapagbibigay ang OHA ng impormasyon sa mga alternatibong anyo tulad ng mga pagsasalin, malaking print, o braille. Makipag-ugnay sa COVID-19 Communications Unit sa 1-971-673-2411, 711 TTY o COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us.