



## 懷疑或確診 COVID-19 病例人士的非緊急運送

可能需要使用私家車接載已確診感染 COVID-19、可能出現 COVID-19 症狀或可能已接觸 COVID-19 的家庭或家庭成員。在共乘私家車時，可以考慮採取以下預防措施以盡量降低傳播 COVID-19 的風險。

### 如果司機和乘客沒有生病（安全運輸的日常習慣）

- 配戴口罩。當很難與人保持至少 6 英尺的距離時，這點尤其重要。
- **注意：**不得在以下情況配戴口罩：
  - 嬰兒及 2 歲及以下的兒童
  - 呼吸困難或失去知覺的任何人士
  - 無能力或無法在沒有幫助的情況下除掉口罩的任何人士
- 當配戴者不知已受感染且沒有症狀時，口罩便可起到保護他人的作用。

### 盡量保持身體距離

- 乘客應盡可能坐在遠離司機和其他乘客的位置。
- 開車時打開車窗，或使用車輛的通風口讓新鮮空氣流通。

### 勤洗雙手



- 出門前，用肥皂和水洗手至少 20 秒，或者使用含至少 60% 酒精的搓手液。


- 到達目的地後，請在抵達時盡快用肥皂和水再次洗手至少 20 秒，或者使用含至少 60% 酒精的搓手液。
- 避免使用未洗乾淨的手接觸眼睛、鼻子和嘴巴。

## 帶備清潔用品



- 出門前，如有，請執拾至少含 60% 酒精的消毒濕巾和搓手液（以防萬一您無法在目的地洗手）。
- 每次旅程後，使用 EPA 已批准的消毒劑清潔和消毒經常觸摸的表面（例如門把手、扶手、安全帶扣）。

## 如果乘客感染 COVID-19 並正在獲接送至接受醫療護理



COVID-19 測試呈陽性、生病或最近與感染 COVID-19 的人士保持密切接觸（近於 6 英尺）的人士，**不應**使用其車輛接載他人或共乘車輛。他們應該留在家中，除非要就醫。

如可能，COVID-19 患者應乘坐沒有其他乘客的車輛前往就醫。如果無法自行駕車前往就醫，司機則在接送懷疑或確診感染 COVID-19 的患病乘客時，可以參考以下建議。

## 配戴呼吸防護罩



- 可能的話，司機應該戴上外科手術或 N95 口罩和面部防護罩。
- 患病的乘客應配戴外科手術口罩或布面罩。

## 限制緊密接觸



- 乘客應盡量坐在後排，盡量遠離司機。
- 車輛越大越好。小型貨車和其他大型車輛可讓乘客和司機保持最遠距離。
- 開車時打開車窗，或使用車輛的通風口讓新鮮空氣流通。
- 避免接載其他乘客。

## 清潔和消毒



- 接載懷疑或確認感染 COVID-19 的乘客後，清潔並消毒車輛。
- 每次都要遵守清潔和消毒程序。清潔車輛時，車門和車窗應保持打開。清潔和消毒時，請戴上與清潔產品一起使用的一次性手套以及口罩。

- 清潔後，請脫下手套，並將其丟入垃圾桶。立即用肥皂和水洗手至少 20 秒，如果沒有肥皂和水，請使用含至少 60% 酒精的搓手液。在可能的情況下，請使用最熱的水洗滌在清潔和消毒時所穿的衣服，並在洗滌後完全晾乾。處理骯髒衣服後請務必洗手。
- 在接載其他任何人之前，請確保從車輛上清除所有清潔殘留物（薄膜）。

## 參考文獻

OHA - [非緊急運送指引](#)

CDC - [COVID-19 疫情期間部落社區非緊急車輛運送的注意事項](#)

CDC - [非緊急運輸車輛的清潔和消毒](#)

**索取無障礙文件：**對於傷殘人士或說其他語言的非英語人士，OHA 可以提供其他格式的資料，例如：翻譯、大字體或盲文版本。請致電 1-971-673-2411、711 聽障專線（TTY）或電郵至 [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us) 與健康資訊中心聯絡。