

潛伏結核 (TB) 感染藥物

須知事項

ISONIAZID 和 RIFAMPIN

您已獲得治療潛伏結核 (Tuberculosis, TB) 感染的藥物。您並未患有 TB 疾病且也不會將 TB 傳染給他人。此藥物的目的是要預防您罹患 TB 疾病。

在服用此藥物期間：

- ✓ 請將您對藥物的疑問或顧慮告知醫生或護士。
- ✓ 每週按時赴診。
- ✓ 與醫生或護士討論任何酒精的使用。在服用此藥物期間，最好不要飲酒。
- ✓ 告知醫生或護士您正在服用的所有其他藥物。
- ✓ 請務必告知您的其他醫生您目前正在接受潛伏 TB 感染的治療。
- ✓ 有些人認為此藥物最好隨食物服用。

協助您服藥的建議：

- ✓ 每天固定時間服藥。
- ✓ 設定鬧鐘提醒您服藥的時間到了。
- ✓ 請家人或朋友提醒您。
- ✓ 使用藥盒。
- ✓ 將提醒便條紙貼在鏡子或冰箱上。
- ✓ 在服完藥之後，在日曆上做記號。

潛伏 TB 感染用藥時程：

(醫療服務提供者：請標示適當的藥錠數量)

藥物	時程	每天藥錠數量	時間長度
Isoniazid 和 Rifampin	每天使用		3 個月

您的醫生可能會請您隨藥物服用維他命 B6。

備註

醫生姓名：

診所名稱：

診所電話號碼：

本文件有其他格式可供殘障人士索取或者有英文以外的其他語言版本可供英文能力有限的人士索取。如欲索取本出版物的其他格式或語言版本，請致電 503-358-8516 與 TB 管制部聯絡。



注意這些可能發生的問題：

如果您發生下列任何問題，請立即停止服用藥物並致電與您的 TB 醫生或護士聯絡：

- 食慾減退或沒有食慾
- 胃部不適或胃部痙攣
- 發燒
- 頭痛或身體痠痛
- 噁心或嘔吐
- 尿液呈可樂的顏色或糞便呈淺色
- 容易瘀青或出血
- 皮疹或搔癢
- 皮膚或眼睛顏色變黃
- 嚴重衰弱或疲勞
- 手部或腳部有刺痛感或麻木感
- 頭昏

註：如果您的尿液、唾液或淚液呈橘色，這是正常現象。軟式隱形眼鏡可能會染色。

Oregon
Health
Authority

公共衛生部
醫療體系改革