



COVID-19 加強劑常見問題解答

(更新日期: 2022 年 1 月 11 日)

問：是否推薦加強劑量的 COVID-19 疫苗？

是。美國疾病控制與預防中心 (CDC) 建議所有 12 歲及以上人士在符合條件後接受加強劑量：接種第二劑輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 後五個月，或強生 (Johnson & Johnson) 第一劑後兩個月。12-17 歲人士只有資格接種輝瑞 (Pfizer) 疫苗。

問：接受加強劑後是否有留待觀期？

是。應在接種疫苗後 15-30 分鐘內監測人們的即時副作用。

問：人們可以從哪裡獲得加強劑？

加強劑量可通過藥房、醫生辦公室和診所廣泛獲得，就像今天的 COVID-19 疫苗一樣。使用[疫苗定位器地圖](#)查找您附近的疫苗提供者或致電 211 或 866-698-6155 以獲取任何語言的資料和幫助。不需要提供資格證明，但提供者可能會要求確認您最後一次接種的疫苗。

問：加強劑如何起作用？

初次接種的疫苗系列建立起免疫系統，以產生對抗疾病所需的抗體。隨著時間的推移，免疫反應減弱。加強劑建基於最初的免疫反應，並且往往會產生更高的抗體水平，從而幫助人們保持更長時間的免疫力。

問：加強劑量是否與其他 COVID-19 疫苗劑量不同？

莫德納 (Moderna) 加強劑量為半劑量；意思是指莫德納 (Moderna) 第一劑或第二劑劑量的一半。這是唯一的分別。

輝瑞 (Pfizer) 或強生 (Johnson & Johnson) 疫苗的第一劑、第二劑或加強劑之間沒有區別。

問：有資格獲得第三劑和加強劑的人是否應該都接種第三劑和加強劑？

是。[CDC 建議](#)接受第三劑的免疫功能低下的人也應該接受加強劑。第三劑的輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 疫苗建議給予免疫功能低下，且對其主要疫苗系列沒有產生強烈免疫反應的人士。第三劑應在第二劑後 28 天或更長時間給予。然後，接種輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 後五個月，因為免疫力可能已經減弱，這些人有資格接受加強劑——這將是他們的第四劑。

免疫功能低下並接受了一劑強生作為主要系列的人不應再接受額外的主要劑量；但他們應該在接種這三種疫苗中的任何一種的兩個月後接種加強劑，以提高其免疫力和預防疾病的能力。

問：在給予加強劑量後，提供者需要了解哪些有關安全性和報告的資料？

提供者應監測不良事件，包括局部和全身反應。鼓勵提供者向疫苗不良事件通報數據庫 (VAERS) 報告任何不良反應。<https://vaers.hhs.gov>

問：俄勒岡州是否有足夠的疫苗來滿足需求？

是。您將能夠在方便的地點（藥房、醫生辦公室、您的長期護理機構或某些地點的大規模疫苗接種診所）獲得加強疫苗。請耐心等待。您可能需要進行約診。但別擔心——您目前的疫苗接種仍可提供針對嚴重 COVID-19 疾病的強大保護。

問：我接受了一劑莫德納 (Moderna) 和一劑輝瑞 (Pfizer)。我應該接受哪種加強劑量？

接受混合劑量系列的人可以接受輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 加強劑。您也可以選擇接種強生 (Johnson & Johnson) 疫苗。如果您有其他問題，請諮詢您的醫療保健提供者。

問：我接種了強生 (Johnson & Johnson)。如果我接種輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 加強劑，我需要接種兩劑嗎？

不需要。加強劑量是所有三種疫苗的單一劑量，因此您只需要在強生初次疫苗接種後額外接種一劑疫苗：全劑量輝瑞 (Pfizer) 或強生 (Johnson & Johnson)，或半劑量莫德納 (Moderna)。

問：父母或監護人是否需要陪同 15-17 歲的子女接種加強劑疫苗？

否。根據俄勒岡州法律，15 歲及以上未成年人士可以自行同意接受由醫生、醫生助理、自然療法師、護士、牙醫或視光師，或在這些提供者許可下由其他專業人士所進行的醫療治療，包括：疫苗接種。

問：人們是否需要提供疫苗接種證明才能獲得加強劑量？

否。但是，您的提供者可能會詢問您上次接種疫苗的時間，因為接種應在授權時間段內進行。所有接種人員都應檢查警報系統以確定時間是否合適。

索取無障礙文件：對於殘疾人士或說其他語言的非英語人士，OHA 可以提供其他格式的資料，例如：翻譯、大字體或盲文版本。撥打 1-971-673-2411、711（聽障專線 (TTY)）或電郵 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us 與 COVID-19 通信部門聯絡。