



## 加強劑量，免疫功能低下的第三劑

(更新日期: 2022 年 1 月 11 日)

如需最新的資料，請瀏覽 <https://govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid-19-vaccine>

### 推薦的加強劑量

所有三種 COVID-19 疫苗也可作為以下所列人群中完全接種疫苗的人的加強劑量。人們可以選擇接種哪種疫苗作為加強劑，並且可以在大多數提供 COVID-19 疫苗的地點接種加強劑。

疫苗	推薦給以下人群	時間
<b>輝瑞 (Pfizer)</b> 首劑 0.3 毫升 第二劑 0.3 毫升 加強劑量 0.3 毫升	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 歲及以上</li> <li>現在建議 12 歲及以上免疫功能低下且已接種第三劑疫苗的人士接受加強劑。</li> </ul>	加強劑量 (在第二劑後至少 5 個月)
<b>莫德納 (Moderna)</b> 首劑 0.5 毫升 第二劑 0.5 毫升 加強劑量 0.25 毫升	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 歲及以上</li> <li>現在建議 18 歲及以上免疫功能低下的人士接受加強劑和第三劑。</li> </ul>	加強劑量 (在第二劑後至少 5 個月)
<b>強生 (Johnson &amp; Johnson)</b> 首劑 0.5 毫升 加強劑量 0.5 毫升	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 歲及以上</li> <li>現在建議 18 歲及以上免疫功能低下的人士接受加強劑和強生 (Johnson &amp; Johnson) 疫苗。</li> </ul>	推薦的加強劑量 在第一劑後至少兩個月

## 第三劑適用於免疫功能低下者

如果您的免疫功能低下，您應該在接種第二劑疫苗後至少 28 天接種第三劑 mRNA 疫苗。

疫苗	推薦給以下人群	時間
<b>輝瑞 (Pfizer)</b> <b>12+</b> 首劑 0.3 毫升 第二劑 0.3 毫升 第三劑 0.3 毫升  5-11 歲的兒童劑量 首劑 0.2 毫升 第二劑 0.2 毫升 第三劑 0.2 毫升	5 歲及以上 <u>中度至重度免疫功能低下</u> 且特別容易感染 COVID-19 的人。	第二劑後至少 28 天
<b>莫德納 (Moderna)</b> 首劑 0.5 毫升 第二劑 0.5 毫升 第三劑 0.5 毫升	<u>中度至重度免疫功能低下</u> 且特別容易感染 COVID-19 的人。	第二劑後至少 28 天
<b>強生 (Johnson &amp; Johnson)</b>	強烈建議所有接種強生疫苗 (Johnson & Johnson) 的人士在接種強生 (Johnson & Johnson) 疫苗兩個月後接種三種授權疫苗中的任何一種加強劑。	不適用

**索取無障礙文件：**對於殘疾人士或說其他語言的非英語人士，OHA 可以提供其他格式的資料，例如：翻譯、大字體或盲文版本。撥打 1-971-673-2411、711（聽障專線（TTY））或電郵 [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us) 與 COVID-19 通信部門聯絡。