

單克隆抗體 (mAb) 情況說明書

單克隆抗體 (mAb) 療法可以幫助預防嚴重疾病並減少因 COVID-19 而喪生的人數。

這種療法現在可在全州更多的提供者處獲得，使其更容易獲得。

為什麼要接受 mAb 治療？

- 它非常有效地預防因 COVID-19 而導致的住院治療並減少暴露者中 COVID-19 的發展。
- 它降低了死亡風險。
- 它被證明對 Delta 變種有效。

什麼是單克隆抗體？

單克隆抗體 (mAb) 是實驗室開發的抗體，可阻止病毒進入您的細胞並降低疾病的嚴重程度和住院治療。

誰有資格接受 mAb 治療？

12 歲及以上體重至少 88 磅 (40 公斤) 且符合以下條件的個人：

1. COVID-19 檢測結果為陽性

- 出現症狀後 10 天內
- 有輕度至中度症狀
- 未住院，即可以在家接受治療且未接受氧療
- 並且被認為是高危患者。

或

2. 曾接觸過 COVID-19 或因機構環境（如療養院）中的病例而處於高接觸風險中且未完全接種疫苗且被視為高風險。在某些情況下，完全接種疫苗的人也有資格。

如果我接受單克隆抗體治療，我可以期待什麼？

單克隆抗體治療是使用針頭將液體注入靜脈（輸液）或皮下（皮下）。您的醫療保健提供者或您將接受治療的地點將說明您將接受哪種治療。對於這兩種程序，針頭都由訓練有素的醫療專業人員使用。

如果您未接種疫苗，您應該在治療後等待 90 天才能接種疫苗。

接受 mAb 治療不會改變所需的隔離和隔離的持續時間。繼續遵循當地衛生部門提供的指引。

輸液（在您的靜脈中）

您必須前往有經過專門培訓的工作人員的輸液中心，才能接受單克隆抗體作為輸液。

使用針頭（靜脈內）將這種治療作為液體注入您的靜脈。完成輸液需要 20 - 50 分鐘，甚至可能更長。輸液後您將被要求再等一個小時，以確保您沒有嚴重的副作用。

皮下（在您的皮膚下）

如果您接受皮下單克隆抗體治療，您將在皮膚下的四個不同位置注射四針短針。這些通常包括手臂後部、腹部和/或大腿。接受所有四次注射大約需要 1-3 分鐘。您將被要求在注射後等待一個小時，以確保您沒有嚴重的副作用。

副作用

無論採用哪種治療，您都可能在注射部位感到不適。這是很常見的，應該會在幾天內消失。

有些人可能會出現輕微的反應，包括：

- 短暫的疼痛
- 輕度出血
- 瘀血
- 疼痛
- 腫脹

這些類似於您通過注射獲得其他藥物時可能遇到的情況，例如 Covid-19 疫苗或流感疫苗。這些可能會持續幾天。

如果您注意到注射部位附近出現疼痛、發紅、引流、麻木、刺痛或其他相關症狀等變化，請致電您的醫療保健提供者。

罕見的過敏反應

這種情況很少見，但有些人可能會對單克隆抗體治療產生嚴重的過敏反應。每個人都被要求在治療後至少等待一小時，以確保沒有嚴重的過敏反應，因此如果需要，可以立即提供幫助。

其他嚴重反應

極少數人可能會對治療產生罕見但嚴重的反應。如果您在治療後的幾天內出現以下任何更嚴重的症狀，請諮詢您的醫療保健提供者或尋求醫療護理：

- 胃部不適（噁心、嘔吐或腹瀉）
- 瘙癢、腫脹、皮疹或蕁麻疹
- 頭暈或低血壓
- 心跳的變化
- 任何新的或惡化的症狀
- 呼吸困難
- 衰弱
- 神志混亂

不同類型的單克隆抗體治療

卡西瑞單抗 (Casirivimab) / 依德單抗 (Imdevimab) – 兩種抗體的組合，如果您檢測呈陽性，可幫助您的身體對 COVID-19 病毒做出反應，或在您接觸 COVID-19 病毒時用於預防疾病。這種藥物可以通過靜脈輸注（靜脈內）或皮下注射四針給藥。您需要在治療後監測 1 小時。

巴馬尼單抗 (Bamlanivimab) / 艾替西單抗 (Etesivimab) – 兩種抗體的組合，如果您檢測呈陽性，可幫助您的身體對 COVID-19 病毒做出反應，或在您接觸 COVID-19 病毒時用於預防疾病。這種藥物只能通過靜脈輸注（靜脈）給藥。您需要在治療後監測 1 小時。

索托維單抗 (Sotrovimab) – 如果您檢測呈陽性，一種單一抗體可幫助您的身體對 COVID-19 病毒做出反應。這種藥物只能通過靜脈輸注（靜脈）給藥。您需要在治療後監測 1 小時。

治療後會發生什麼？

治療結束後，您應該回家休息並注意您的 COVID-19 症狀（如果有的話）。如果您在注射部位感到不適，您可以在治療當天使用冷敷。之後，溫暖（如加熱墊）可以幫助治愈任何瘀傷。

大多數人不需要任何額外的後續治療。如果您的醫療保健提供者認為您應該接受額外治療，他們會與您交談。

您可能會開始感覺到您的 COVID-19 症狀迅速改善，或者您可能還需要一段時間才能開始感覺好轉。在某些情況下，您的 COVID-19 症狀可能會惡化。如果您的症狀很嚴重，您應該立即就醫，包括：

- 呼吸困難
- 胸部持續疼痛或壓迫感
- 新的意識模糊
- 無法醒來或保持清醒
- 蒼白、灰色或藍色的皮膚、嘴唇或甲床，取決於膚色。

報告嚴重的副作用

1. 立即告訴您的醫療保健提供者
2. 通過 www.fda.gov/medwatch 或致電 FDA MedWatch 報告您的副作用
1-800-FDA-1088 或致電 1-844-734-6643。

有問題可以致電誰

如果您對治療有疑問或疑慮，請致電您的醫療保健提供者或您接受治療的診所或藥房。

索取無障礙文件：對於殘疾人士或說其他語言的非英語人士，OHA 可以提供其他格式的資料，例如：翻譯、大字體或盲文版本。撥打 1-971-673-2411、711（聽障專線（TTY））或電郵

COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us 與 [COVID-19 通信部門](#) 聯絡。