



COVID-19 疫苗劑量

COVID-19 疫苗	第一劑	第二劑	第三劑* (僅適用於免疫功能低下者)	加強劑*
輝瑞 (Pfizer) 兒童劑 (5-11 歲)	0.2 毫升	0.2 毫升	0.2 毫升	FDA 或 CDC 不推薦
輝瑞 (Pfizer) (12 歲以上)	0.3 毫升	0.3 毫升	0.3 毫升	0.3 毫升 (適用於 12 歲以上人 士, 接種第二劑後 5 個月)
莫德納 (Moderna) (18 歲以上)	0.5 毫升	0.5 毫升	0.5 毫升	0.25 毫升 (適用於 18 歲以上人 士, 接種第二劑後 5 個月)
強生 (J&J; 18 歲以上)	0.5 毫升		FDA 或 CDC 不推薦	0.5 毫升 (適用於 18 歲以上人 士, 接種首劑後 2 個月)

* CDC 建議所有 12 歲及以上人士在符合條件時接種加強劑疫苗：在接種第二劑輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 疫苗後五個月，或接種一劑詹森(Janssen)(強生) (Johnson & Johnson) 疫苗後兩個月。這包括免疫功能低下並接種了第三劑輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 的人士。

索取無障礙文件：對於殘疾人士或說其他語言的非英語人士，OHA 可以提供其他格式的資料，例如：翻譯、大字體或盲文版本。撥打 1-971-673-2411、711 (聽障專線 (TTY)) 或電郵 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us 與 COVID-19 通信部門聯絡。