

## COVID-19 疫苗劑量

COVID-19 疫苗	第一劑	第二劑	第三劑	額外劑量 <sup>1</sup> (僅適用於免疫功能低下者)	加強劑 <sup>2</sup>
莫德納 (Moderna) 單價兒童劑基礎系列 (6 個月- 5 歲)	0.25 毫升 (深藍色蓋、洋紅色標籤邊框)	0.25 毫升	不適用	0.25 毫升	不適用
輝瑞 (Pfizer) 單價兒童劑基礎系列 (6 個月至 4 歲)	0.2 毫升 (栗色蓋)	0.2 毫升	0.2 毫升	不適用	不適用
輝瑞 (Pfizer) 兒童劑基礎系列 (5 至 11 歲)	0.2 毫升 (橙色蓋)	0.2 毫升	不適用	0.2 毫升	0.2 毫升
莫德納 (Moderna) 單價兒童劑基礎系列 (6 至 11 歲)	0.5 毫升 (深藍色蓋、藍綠色或紫色標籤邊框)	0.5 毫升	不適用	0.5 毫升	不適用
輝瑞 (Pfizer) 二價加強劑量 (5 至 11 歲)	不適用	不適用	不適用	不適用	0.2 毫升 (橙色蓋、橙色標籤邊框)
莫德納 (Moderna) 二價加強劑量 (6 至 11 歲)	不適用	不適用	不適用	不適用	0.5 毫升 (深藍色蓋、灰色標籤邊框)
輝瑞 (Pfizer) 單價基礎劑量 (12 歲或以上)	0.3 毫升 (灰色蓋)	0.3 毫升	不適用	0.3 毫升	此製劑未被授權作為加強劑量；請參閱以下的二價加強選項
莫德納 (Moderna) 單價基礎劑量 (12 歲或以上)	0.5 毫升 (紅色蓋、淺藍色標籤邊框)	0.5 毫升	不適用	0.5 毫升	此製劑未被授權作為加強劑量；請參閱以下的二價加強選項。

輝瑞 (Pfizer) 二價加強劑量 (12 歲或以上)	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3 毫升 (灰色蓋)
莫德納 (Moderna) 二價加強劑量 (12 歲或以上)	不適用	不適用	不適用	不適用	0.5 毫升 (深藍色蓋、灰色標籤邊框)
強生 (Johnson & Johnson) (18 歲或以上)	0.5 毫升	不適用	不適用	請參閱以下備註	請參閱以下備註
Novavax <sup>3</sup> (12 歲或以上)	0.5 毫升	0.5 毫升	不適用	不適用	不適用

**備註：**免疫功能低下並已接種強生 (Johnson & Johnson) 疫苗者應在其首劑疫苗後至少 28 天接種額外一劑單價 (原始疫苗配方) mRNA 疫苗 (輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna))。然後在他們的額外劑量後至少兩個月或在他們最近的單價加強劑後至少兩個月，接種二價 (更新疫苗配方) mRNA 疫苗的加強劑量。

<sup>1</sup> CDC 建議免疫功能低下並接種輝瑞 (Pfizer) (5 歲或以上) 或莫德納 (Moderna) (6 個月或以上) 疫苗者在第二劑疫苗後至少 28 天接種額外 (單價) 劑量。免疫功能低下者的額外一劑疫苗是基礎疫苗系列的一部分。目前不建議為 6 個月至 4 歲的兒童接種額外劑量的輝瑞 (Pfizer) 疫苗。

<sup>2</sup> CDC 建議已接種輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 疫苗的 5 歲或以上人士以及已接種強生 (Johnson & Johnson) 疫苗的 18 歲或以上人士，在合資格時接種莫德納 (Moderna) 或輝瑞 (Pfizer) 二價加強劑量；合資格是指完成接種基礎系列疫苗後 (包括免疫功能低下者的額外劑量) 至少 2 個月，或接種最近的單價加強劑後至少 2 個月。

<sup>3</sup> 對於 Novavax 疫苗接種者，目前不建議免疫功能低下者接種額外的劑量。

**無障礙文件索取：**對於殘疾人士或說其他語言的非英語人士，OHA 可以提供其他格式的資料，例如：翻譯、大字體或盲文版本。撥打 1-971-673-2411、711 聽障專線 (TTY) 或電郵 [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us) 與 COVID-19 通訊部門聯絡。