

潛伏結核 (TB) 感染藥物的

須知事項

ISONIAZID

您已獲得治療潛伏結核 (Tuberculosis, TB) 感染的藥物。您並未患有 TB 疾病且也不會將 TB 傳染給他人。此藥物的目的是要預防您罹患 TB 疾病。

在服用此藥物期間：

- 請將您對藥物的疑問或顧慮告知醫生或護士
- 前往診所就診。
- 與醫生或護士討論任何酒精的使用。在服用此藥物期間最好不要飲酒。
- 告知醫生或護士您正在服用的所有其他藥物。
- 請務必告知您的其他醫生您目前正在接受潛伏 TB 感染的治療。
- 按照 TB 醫生或護士的指示服用您的所有藥物。
- 有些人認為此藥物最好隨食物服用。

協助您服藥的建議：

- ✓ 每天固定時間服藥。
- ✓ 設定鬧鐘提醒您服藥的時間到了。
- ✓ 請家人或朋友提醒您。
- ✓ 使用藥盒。
- ✓ 將提醒便條紙貼在鏡子或冰箱上。
- ✓ 在服完藥之後，在日曆上做記號。

潛伏 TB 感染用藥時程：

(醫療服務提供者：請標示適當的用藥時程、天數及藥錠數量)

藥物	時程	天數	每天藥錠數量	時間長度
Isoniazid	每日	每天		9 個月

您的醫生可能會請您隨藥物服用維他命 B6。

如果您忘記服用藥物：如果還在同一天，請在您記起之後盡速服藥。

如果該天已經過去，請跳過漏服的該劑藥物並服用下一劑預定服用的藥物 — 請勿同時服用 2 劑藥物。

註記

醫生姓名：

診所名稱：

診所電話號碼：

本文件有其他格式可供殘障人士索取或者有英文以外的其他語言版本可供英文能力有限的人士索取。如欲索取本出版物的其他格式或語言版本，請致電 503-358-8516 與 TB 管制部聯絡。



注意這些可能發生的問題：

如果您發生下列任何問題，請立即停止服用藥物並致電與您的 TB 醫生或護士聯絡：

- 食慾減退或沒有食慾
- 胃部不適或胃部痙攣
- 噁心或嘔吐
- 尿液呈可樂色或糞便顏色變淡
- 皮疹或搔癢
- 皮膚或眼睛顏色變黃
- 手部或腳部刺痛或發麻

Oregon
Health
Authority

公共衛生部
醫療體系改革