

لقاحات فيروس كوفيد-19 والسلامة منه: فهم الفوائد والمخاطر

مخاطر لقاح الرنا المرسال (mRNA)

- نُدرة حدوث إصابة بالتهاب عضلة القلب — التهاب عضلة القلب.
- ترتفع نسبة الخطورة بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عامًا.

فوائد لقاح الرنا المرسال (mRNA)

- مستوى عالٍ جدًا من الحماية ضد كوفيد-19 وما يرتبط به من العلاج في المستشفى.
- يمكن أن يؤدي المزيد من اللقاحات إلى خفض انتشار الفيروس، والذي من شأنه أن يقي من حدوث تحورات جديدة لفيروس كوفيد-19 وانتشاره.
- الوقاية من "الآثار طويلة الأمد لفيروس كوفيد-19".
- الوقاية من عدوى كوفيد-19، والتي يمكن أن تسبب التهاب عضلة القلب، ومشاكل عصبية، وضعف وظائف الرئة وتلف القلب الشديد.

من النادر جدًا أن يصاب شخص ما بالتهاب عضلة القلب بعد تطعيمه بلقاح الرنا المرسال (mRNA) ، ولكنه يحدث بشكل أكثر شيوعًا بعد الجرعة الثانية من سلسلة الجرعتين.

يجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا واجهت أي من الأعراض التالية في غضون ثلاثة إلى سبعة أيام بعد التطعيم:

- الشعور بالألم أو ضغط على الصدر
- ضيق في التنفس

تقف هيئة الصحة بولاية أوريغون إلى جانب البحوث التي تجريها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية وتشجع جميع الناس في ولاية أوريغون على الحصول على التطعيم.

تلقي الجرعات الثانية من لقاح الرنا المرسال مقابل حدوث حالات التهاب عضلة القلب

تلقي 133 مليون
جرعة ثانية
من لقاح الرنا المرسال (mRNA)

أبلغ عن 636 حالة فقط من
التهاب عضلة القلب من بين 133
مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية

التنسيقات البديلة للمستند: بالنسبة للأفراد ذوي الإعاقة أو الأفراد الذين يتحدثون لغة أخرى غير الإنجليزية، يمكن لهيئة الصحة بولاية أوريغون (OHA) توفير المعلومات بأشكال بديلة مثل الترجمات أو الطباعة بأحرف كبيرة أو طريقة برايل. يُرجى الاتصال بمركز المعلومات الصحية على الرقم 1-971-673-2411 ، أو على الهاتف النصي على الرقم 711 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني COVID19.LanguageAccess@dhs.ohs.state.or.us