



## الجرعات المعززة، الجرعات الثالثة لمن يعانون من ضعف جهاز المناعة

(آخر تحديث في 11-1-2022)

لمعرفة أحدث المعلومات، تفضل بزيارة <https://govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid-19-vaccine>

### الجرعات المعززة الموصى بها

لقاحات كوفيد-19 الثلاثة كلها متاحة أيضًا كجرعة معززة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في الفئات الواردة أدناه. يمكن للأشخاص اختيار اللقاح الذي سيحصلون عليه باعتباره معززًا ويمكنهم الحصول على جرعة معززة في معظم المواقع التي توفر لقاحات كوفيد-19.

التوقيت	موصى به للفئات التالية	اللقاح
جرعة معززة بعد خمسة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• من هم في سن 12 عامًا وما فوق</li> <li>• يوصى الآن بجرعة معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة وتلقوا جرعة ثالثة.</li> </ul>	<p>فايزر</p> <p>الجرعة الأولى 0.3 مل الجرعة الثانية 0.3 مل الجرعة المعززة 0.3 مل</p>
جرعة معززة بعد خمسة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• من هم في سن 18 عامًا وما فوق</li> <li>• يوصى الآن بجرعة معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة وتلقوا جرعة ثالثة.</li> </ul>	<p>موديرنا</p> <p>الجرعة الأولى 0.5 مل الجرعة الثانية 0.5 مل الجرعة المعززة 0.25 مل</p>
الجرعة المعززة موصى بها بعد الجرعة الأولى بشهرين على الأقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>• من هم في سن 18 عامًا وما فوق</li> <li>• يوصى الآن بجرعة معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة وتلقوا لقاح جونسون آند جونسون.</li> </ul>	<p>جونسون آند جونسون</p> <p>الجرعة الأولى 0.5 مل الجرعة المعززة 0.5 مل</p>

## الجرعات الثالثة للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، فعليك أن تحصل على جرعة ثالثة من لقاح مصنوع من الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) بعد 28 يومًا على الأقل من تلقي جرعتك الثانية.

التوقيت	موصى به للفئات التالية	اللقاح
بعد 28 يومًا على الأقل من تلقي الجرعة الثانية	الأشخاص في سن 5 سنوات وأكبر والذين يعانون من <u>ضعف جهاز المناعة بدرجة معتدلة إلى شديدة</u> المعرضون بصفة خاصة للإصابة بمرض كوفيد-19.	فايزر 12+ الجرعة الأولى 0.3 مل الجرعة الثانية 0.3 مل الجرعة الثالثة 0.3 مل  جرعة الأطفال للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا الجرعة الأولى 0.2 مل الجرعة الثانية 0.2 مل الجرعة الثالثة 0.2 مل
بعد 28 يومًا على الأقل من تلقي الجرعة الثانية	الأفراد الذين يعانون من <u>ضعف جهاز المناعة بدرجة معتدلة إلى شديدة</u> المعرضون بصفة خاصة للإصابة بمرض كوفيد-19.	موديرنا الجرعة الأولى 0.5 مل الجرعة الثانية 0.5 مل الجرعة الثالثة 0.5 مل
لا يوجد	يُنصح بشدة كل من حصل على لقاح جونسون أند جونسون بالحصول على جرعة معززة من أي من اللقاحات الثلاثة المصرح بها بعد مرور شهرين من تلقي لقاح جونسون أند جونسون.	جونسون أند جونسون

إمكانية الوصول إلى المستند: بالنسبة للأفراد ذوي الإعاقات أو الأفراد الذين يتحدثون لغةً أخرى غير الإنجليزية، يمكن أن توفر هيئة الصحة بولاية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة بالأحرف الكبيرة أو طريقة برايل. اتصل بوحدة اتصالات كوفيد-19 على الرقم 1-971-673-2411، الهاتف النصي (TTY) على الرقم 711 أو [.COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us)