

صفحة معلومات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (mAb)

يمكن أن يساعد العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة (mAb) في الوقاية من الأمراض الشديدة وتقليل عدد الوفيات الناجم عن مرض كوفيد-19.

يتوفر هذا العلاج الآن لدى المزيد من مقدمي الخدمات في جميع أنحاء الولاية، مما يسهل الحصول عليه.

ما سبب أهمية تلقي العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟

- أنه فعّال للغاية في منع دخول المستشفى بسبب كوفيد-19 وتقليل تطور كوفيد-19 لدى الذين تعرضوا للعدوى.
- يقلل من خطر الموت.
- ثبت فعاليته ضد متحور دلتا.

ما هي الأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي أجسام مضادة تم تطويرها في المختبر تمنع الفيروس من دخول الخلايا وتقلل من شدة المرض ودخول المستشفى لتلقي العلاج.

مَن هو المؤهل لتلقي العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟

الأفراد الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر والذين لا يقل وزنهم عن 88 رطلاً (40 كجم) والذين:

1. ثبت إصابتهم بعدوى كوفيد-19

- في غضون 10 أيام من ظهور الأعراض
- تظهر عليهم أعراض خفيفة إلى معتدلة
- لم يتم إدخالهم إلى المستشفى، أي يمكن معالجتهم في المنزل ولا يخضعون للعلاج بالأكسجين
- ويعتبرون مرضى معرضون لخطورة شديدة.

أو

2. تعرضوا لعدوى كوفيد-19 أو معرضون لخطر التعرض للعدوى بشكل كبير بسبب حالات في بيئة مؤسسية (مثل دور رعاية المسنين) ولم يتلقوا اللقاح بالكامل ويعتبر معرضون لخطورة شديدة. الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل مؤهلون أيضًا في حالات معينة.

ماذا يمكنني أن أتوقع إذا تلقيت علاجًا بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟

العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة هو سائل يُعطى باستخدام إبرة إما في الوريد (التسريب) أو تحت الجلد. وسيشرح مقدم الرعاية الصحية المتابع لك أو الموقع الذي ستتلقى فيه العلاج أي العلاج الذي ستحصل عليه. وفي كلا الإجراءين، لا يُعطى الحقن إلا أخصائي طبي مدّرب.

إذا لم تتلقَ اللقاح، فيجب عليك الانتظار 90 يومًا بعد العلاج للحصول على اللقاح.

لا يغير تلقي علاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة مدة الحجر الصحي والعزل المطلوبة. ويجب مواصلة اتباع الإرشادات المقدمة من وزارة الصحة المحلية.

التسريب (في الوريد)

سيتمتع عليك الذهاب إلى مركز تسريب به موظفين مدربين تدريبًا خاصًا لتلقي حقن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

يُعطى هذا العلاج في شكل سائل في الوريد باستخدام إبرة (في الوريد). سيستغرق إكمال عملية التسريب 20 إلى 50 دقيقة، وربما أكثر. وسيُطلب منك الانتظار لمدة ساعة أخرى بعد الحقن للتأكد من عدم وجود آثار جانبية خطيرة.

تحت الجلد

إذا تلقيت علاجًا بأجسام مضادة وحيدة النسيلة تحت الجلد، فستحصل على أربع حقن بإبرة قصيرة يتم إدخالها تحت جلدك في أربعة أماكن مختلفة في جسمك. وعادةً ما تشمل هذه الأماكن الجزء الخلفي من الذراعين والمعدة و/أو الفخذين. يستغرق تلقي جميع الحقن الأربع حوالي دقيقة إلى 3 دقائق. وسيُطلب منك الانتظار لمدة ساعة بعد الحقن للتأكد من عدم تعرضك لأعراض جانبية خطيرة.

الآثار الجانبية

مع أي من العلاجين، قد تشعر ببعض الانزعاج في مكان الحقن. وهذا الأمر شائع وسيزول في غضون أيام قليلة.

قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل خفيف بما في ذلك:

- الشعور بالألم لفترة وجيزة
- نزيف بسيط
- التكدم
- الوجع
- التورم

هذه الآثار تشبه ما قد تواجهه عند أخذ أدوية أخرى عن طريق الحقن، مثل لقاح كوفيد-19 أو لقاح الأنفلونزا. وقد تستمر لبضعة أيام.

إذا لاحظت تغيرات مثل الألم أو الاحمرار أو النزح أو التتميل أو الوخز أو غيرها من الأعراض المقلقة بالقرب من مكان الحقن، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك.

رد فعل تحسسي نادر

إنه نادر الحدوث، ولكن يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي شديد تجاه العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة. ويُطلب من الجميع الانتظار لمدة ساعة واحدة على الأقل بعد تلقي العلاج للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي خطير وبالتالي يمكن تقديم المساعدة على الفور إذا لزم الأمر.

ردود الفعل الخطيرة الأخرى

قد يعاني عدد قليل جدًا من الأشخاص من رد فعل نادر ولكنه خطير تجاه العلاج. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك أو اطلب الرعاية الطبية إذا كان لديك أي من هذه الأعراض الأكثر خطورة في الأيام التي تلي علاجك:

- اضطراب المعدة (غثيان، أو تقيؤ، أو إسهال)
- حكة، أو تورم، أو طفح جلدي، أو شرى
- دوخة أو انخفاض ضغط الدم
- تغييرات في ضربات القلب
- أي أعراض جديدة أو تفاقم الأعراض
- صعوبة التنفس
- الضعف
- الارتباك

الأنواع المختلفة من علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة

كاسيريفيماب/إيميفيماب - توليفة من اثنتين من الأجسام المضادة لمساعدة جسمك على الاستجابة لفيروس كوفيد-19 إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية أو لاستخدامها للوقاية من المرض إذا تعرضت لفيروس كوفيد-19. يمكن إعطاء هذا الدواء من خلال التسريب الوريدي (في الوريد) أو على شكل أربع حقن تحت الجلد. وسوف تخضع للمراقبة لمدة ساعة بعد تلقي العلاج.

باملانيفاماب/إيتيسيفيماب - توليفة من اثنتين من الأجسام المضادة لمساعدة جسمك على الاستجابة لفيروس كوفيد-19 إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية أو لاستخدامها للوقاية من المرض إذا تعرضت لفيروس كوفيد-19. يمكن إعطاء هذا الدواء من خلال التسريب الوريدي (في الوريد) فقط. وسوف تخضع للمراقبة لمدة ساعة بعد تلقي العلاج.

سوتروفيماب - جسم مضاد أحادي لمساعدة جسمك على الاستجابة لفيروس كوفيد-19 إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية. يمكن إعطاء هذا الدواء من خلال التسريب الوريدي (في الوريد) فقط. وسوف تخضع للمراقبة لمدة ساعة بعد تلقي العلاج.

ماذا تتوقع بعد العلاج؟

بعد العلاج، يجب عليك العودة إلى المنزل والاسترخاء والاعتناء بأعراض كوفيد-19 إذا ظهرت عليك أي أعراض. وإذا شعرت بعدم الراحة في مكان الحقن، فيمكنك استخدام كمادة تليجية في يوم العلاج. بعد ذلك، يمكن أن يساعد الدفء (مثل وسادة التدفئة) في النوم أي كدمات.

لن يحتاج معظم الأشخاص إلى أي علاجات متابعة إضافية. وسيتحدث معك مقدم الرعاية الصحية إذا اعتقد أنه يجب عليك الحصول على علاج إضافي.

قد تبدأ في الشعور بتحسن أعراض كوفيد-19 بسرعة، أو قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ في الشعور بالتحسن. في بعض الحالات، قد تعاني من تفاقم أعراض كوفيد-19. ويجب أن تطلب العناية الطبية فورًا إذا كانت أعراضك خطيرة، وتشمل تلك الأعراض الخطيرة:

- صعوبة التنفس
- ألم أو ضغط مستمر في الصدر
- تشوش جديد
- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا
- أصبح لون الجلد أو الشفتين أو الأظافر شاحب أو رمادي أو أزرق، حسب لون البشرة.

لإبلاغ عن أعراض جانبية خطيرة

1. أخبر مقدم الرعاية الصحية المتابع لك فورًا

أبلغ برنامج MedWatch التابع لإدارة الغذاء والدواء بأي آثار جانبية من خلال www.fda.gov/medwatch أو اتصل على الرقم 1-800-FDA-1088 ، أو اتصل على الرقم 1-844-734-6643.

جهة الاتصال التي يمكن الاتصال بها بخصوص أي أسئلة

إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن علاجك، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع بك أو بالعيادة أو الصيدلية التي تلقيت فيها العلاج.

إمكانية الوصول إلى المستند: بإمكان هيئة صحة أوريغون أن توفر معلومات بصيغ بديلة كالترجمات أو الطباعة بالأحرف الكبيرة أو طريقة برايل للأفراد ذوي الإعاقات أو الأفراد الناطقين بلغة أخرى غير الإنجليزية. اتصل بوحدة اتصالات كوفيد-19 على الرقم 1-971-673-2411، الهاتف النصي (TTY) على الرقم 711 أو [.COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us)