



جرعات لقاح كوفيد-19

الجرعة المعززة*	الجرعة الثالثة* (للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة فقط)	الجرعة الثانية	الجرعة الأولى	لقاح كوفيد-19
لا تُوصى بها إدارة الغذاء والدواء (FDA)، ولا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)	0.2 مل	0.2 مل	0.2 مل	لقاح فايزر للأطفال (من سن 5 سنوات إلى 11 سنة)
0.3 مل (للأشخاص ابتداءً من عمر 12 عامًا، بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية)	0.3 مل	0.3 مل	0.3 مل	فايزر (ابتداءً من عمر 12 عامًا)
0.25 مل (للأشخاص في عمر 18 عامًا فأكثر، بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية)	0.5 مل	0.5 مل	0.5 مل	موديرنا (ابتداءً من عمر 18 عامًا)
0.5 مل (للأشخاص في عمر 18 عامًا فأكثر، بعد شهرين من الجرعة الأولى)	لا تُوصى بها إدارة الغذاء والدواء (FDA)، ولا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)		0.5 مل	جانسين (جونسون أند جونسون؛ للأشخاص في عمر 18 عامًا فأكثر)

*توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن يحصل كل شخص في عمر 12 عامًا فأكثر على جرعة معززة عندما يكون مؤهلاً: بعد خمسة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو لقاح موديرنا أو بعد شهرين من تلقي لقاح جانسين (جونسون أند جونسون). ويشمل هذا المصابين بضعف جهاز المناعة ممن تلقوا جرعة ثالثة من لقاح فايزر أو موديرنا.

إمكانية الوصول إلى المستند: بالنسبة للأفراد ذوي الإعاقات أو الأفراد الذين يتحدثون لغةً أخرى غير الإنجليزية، يمكن أن توفر هيئة الصحة بولاية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة بالأحرف الكبيرة أو طريقة برايل. اتصل بوحدة اتصالات كوفيد-19 على الرقم 1-971-673-2411، الهاتف النصي (TTY) على الرقم 711 أو COVID19.LanguageAccess@dhs.ohio.gov.