

جرعات لقاح كوفيد-19

لقاح كوفيد-19	الجرعة الأولى	الجرعة الثانية	الجرعة الثالثة	الجرعة الإضافية 1 (للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة فقط)	الجرعات المعززة ²
سلسلة أولية من لقاح موديرنا أحادي التكافؤ المخصص للأطفال (6 أشهر – 5 سنوات)	0.25 مل (غطاء أزرق داكن، حدود الملصق أرجوانية)	0.25 مل	لا يوجد	0.25 مل	لا يوجد
سلسلة أولية من لقاح فايزر أحادي التكافؤ المخصص للأطفال (6 أشهر – 4 سنوات)	0.2 مل (غطاء أحمر داكن)	0.2 مل	0.2 مل	لا يوجد	لا يوجد
سلسلة أولية من لقاح فايزر المخصص للأطفال (العمر 5 سنوات – 11 سنة)	0.2 مل (غطاء برتقالي)	0.2 مل	لا يوجد	0.2 مل	0.2 مل
سلسلة أولية من لقاح موديرنا أحادي التكافؤ المخصص للأطفال (العمر 6 سنوات – 11 سنة)	0.5 مل (غطاء أزرق داكن، حدود الملصق أزرق مخضر أو أرجواني)	0.5 مل	لا يوجد	0.5 مل	لا يوجد
جرعة معززة من لقاح فايزر ثاني التكافؤ (العمر 5 سنوات – 11 سنة)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	0.2 مل (غطاء برتقالي، حدود الملصق برتقالية)
جرعة معززة من لقاح موديرنا ثاني التكافؤ (العمر 6 سنوات – 11 سنة)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	0.5 مل (غطاء أزرق داكن، حدود الملصق رمادية)
سلسلة أولية من لقاح فايزر أحادي التكافؤ (العمر من 12 سنة فما فوق)	0.3 مل (غطاء رمادي)	0.3 مل	لا يوجد	0.3 مل	هذه التركيبة غير مصرح بها كجرعة معززة؛ انظر خيارات الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ أدناه
سلسلة أولية من لقاح موديرنا أحادي التكافؤ (العمر 12 سنة فما فوق)	0.5 مل (غطاء أحمر، حدود الملصق أزرق فاتح)	0.5 مل	لا يوجد	0.5 مل	هذه التركيبة غير مصرح بها كجرعة معززة؛ انظر خيارات الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ أدناه.
جرعة معززة من لقاح فايزر ثاني التكافؤ (ابتداءً من عمر 12 عامًا)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	0.3 مل (غطاء رمادي)

جرعة معززة من لقاح موديرنا ثاني التكافؤ (العمر 12 سنة فما فوق)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	0.5 مل (غطاء أزرق داكن، حدود الملصق رمادية)
جونسون آند جونسون (العمر 18 سنة فما فوق)	0.5 مل	لا يوجد	لا يوجد	انظر الملاحظة أدناه	انظر الملاحظة أدناه
نوفافاكس ³ (من عمر 12 عامًا فما فوق)	0.5 مل	0.5 مل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

ملاحظة: يجب أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة والذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون على جرعة إضافية من لقاح mRNA (تركيبية فايزر الأصلية) أحادي التكافؤ (فايزر أو موديرنا) بعد 28 يومًا على الأقل من تلقي الجرعة الأولية. ثم تلقي جرعة معززة من لقاح mRNA ثنائي التكافؤ (تركيبية اللقاح المحدثة) بعد شهرين على الأقل من تلقي الجرعة الإضافية أو شهرين على الأقل بعد تلقي آخر جرعة معززة أحادية التكافؤ.

¹توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة ممن تلقوا لقاح فايزر (لمن هم في سن 5 سنوات فأكثر) أو موديرنا (لمن هم في سن 6 أشهر فأكثر) بالحصول على جرعة إضافية (أحادية التكافؤ) بعد 28 يومًا على الأقل من تلقيهم الجرعة الثانية. الجرعات الإضافية للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة هي جزء من سلسلة اللقاحات الأولية. لا يوصى في هذا الوقت بتلقي جرعات إضافية من لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

²توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وأكثر ممن تلقوا لقاح فايزر أو موديرنا أو ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة وأكثر وتلقوا لقاح جونسون آند جونسون بالحصول على الجرعة المعززة من لقاح فايزر أو موديرنا ثنائي التكافؤ عندما يكونوا مؤهلين—أي بعد شهرين على الأقل من الانتهاء من السلسلة الأولية (بما في ذلك الجرعات الإضافية كما هو محدد للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة) أو شهرين بعد تلقي آخر جرعة معززة أحادية التكافؤ.

³لا يوصى حاليًا بجرعات إضافية للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة ممن تلقوا لقاح نوفافاكس.

إمكانية الوصول إلى المستند: بإمكان هيئة الصحة بولاية أوريغون أن توفر معلومات بصيغ بديلة كالترجمات أو الطباعة بالأحرف الكبيرة أو طريقة برايل للأفراد ذوي الإعاقات أو الأفراد الناطقين بلغة أخرى غير الإنجليزية. اتصل بوحدة اتصالات كوفيد-19 على الرقم 1-971-673-2411، الهاتف النصي 711 أو عبر COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us