

جرعات لقاح كوفيد-19

جرعات اللقاح	الجرعة الأولى	الجرعة الثانية	الجرعة الثالثة* (للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة فقط)	الجرعة المعززة*
لقاح فايزر للأطفال (من سن 5 إلى 11 سنة)	0.2 مل	0.2 مل	0.2 مل	لا يُوصى به
فايزر (عمر 12 عامًا فأكثر)	0.3 مل	0.3 مل	0.3 مل	0.3 مل
موديرنا (عمر 18 عامًا فأكثر)	0.5 مل	0.5 مل	0.5 مل	0.25 مل
جانسين (جونسون آند جونسون؛ للفئات بعمر 18 عامًا فأكثر)	0.5 مل	لا يُوصى به	لا يُوصى به	0.5 مل

*توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن يحصل كل شخص في سن 12 عامًا فأكثر على جرعة معززة عندما يكون مؤهلاً لتلقي الجرعة: بعد خمسة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو لقاح موديرنا وبعد شهرين من لقاح جانسين (جونسون آند جونسون). وهذا يشمل الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة وقد يكونون قد تلقوا جرعة ثالثة من لقاح فايزر أو موديرنا