

## فيروس جدري القروء (hMPXV): الأسئلة الشائعة

### معلومات حول الفيروس

#### س: ما هو فيروس hMPXV؟

إن hMPXV، أو جدري القروء، هو اختصار لفيروس جدري القروء البشري. ويعد جدري القروء (hMPXV) فيروس حمض نووي ريبوزي مرتبط بالجدري. ويصيب هذا الفيروس الحيوانات وهو مستوطن (بمعنى أنه موجود باستمرار ولكنه يقتصر عادةً على منطقة معينة) في مناطق الغابات في وسط وغرب إفريقيا. ومن غير الواضح ما هي الحيوانات التي تعمل كمستودع لجدري القروء (hMPXV)، لكن القوارض هي المشتبه به الرئيسي. كما يمكن للفيروس أيضاً أن يصيب الفئران والسنجاب وكلاب البراري وبعض القروء، من بين حيوانات أخرى.

تم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بهذا الفيروس في عام 1970. وهناك نوعان من السلالات من فيروس hMPXV: السلالة MPXV-1 وعادةً ما تكون أكثر حدة ومعدل وفاة الحالة يصل إلى 10%. والسلالة MPXV-2 وهي تكون مرضاً أكثر اعتدالاً. يبلغ معدل الوفيات المقدرة في البلدان المستوطن بها الفيروس حوالي 1%. وتسببت السلالة MPXV-2 في انتشار الفيروس عام 2022 في البلدان التي لا يستوطن فيها الفيروس.

#### س: هل هذا الفيروس يشبه مرض الجدري؟

إنه في نفس مجموعة الفيروسات، لكن هذا ليس مرض الجدري. إذ يصعب الإمساك بجدري القروء (hMPXV)، كما أنه ليس شديد الخطورة. وهناك نوعان من سلالات هذا الفيروس، والسلالة الرئيسية التي تنتشر الآن تسبب مرضاً أكثر اعتدالاً. ويتعافى معظم الأشخاص المصابين في المنزل دون تلقي أي علاج خاص.

#### س: هل ظهرت أي حالات إصابة بهذا الفيروس في ولاية أوريغون؟

نعم. للاطلاع على تحديث حول عدد الحالات في ولاية أوريغون، تفضل بزيارة

[www.oregon.gov/oha/ph/monkeypox](http://www.oregon.gov/oha/ph/monkeypox)

#### س: من الذي يمكن أن يُصاب بفيروس جدري القروء (hMPXV)؟

أي شخص يمكن أن يُصاب بفيروس جدري القروء (hMPXV). في ولاية أوريغون، تُظهر بياناتنا أن الرجال المتوافقين جنسياً والأشخاص غير ثنائيي النوع يصابون في الغالب بفيروس جدري القروء (hMPXV). في حين أن معظمهم يعتبرون مثليين ويبلغون عن مخالطة الأشخاص المحددين ذكور عند الولادة، فإن بعض الحالات تحدد على أنها مباشرة و/أو تبلغ عن مخالطة مع الأشخاص المحددين إناث عند الولادة.

وبناءً على هذه البيانات، تعطي هيئة صحة أوريغون الأولوية لتمكين مجتمعات المثليين بالمعلومات والاختبار والوقاية واستراتيجيات العلاج للبقاء في صحة جيدة. كما أُصيبت أعداد صغيرة من النساء والأطفال بفيروس جدري القروء (hMPXV) في فترة الانتشار الحالي للفيروس.

### س: ما سبب تسمية هذا الفيروس بجذري القروود؟

أُطلق على الفيروس هذا الاسم لأن تم اكتشافه أول انتشار له في القرود بمختبر دنماركي في عام 1958. ومع ذلك، فإن اسم "جذري القروود" من حيث علاقته بالانتشار الحالي والأحدث هو أمر مفضل من حيث أن العوامل الطبيعية هي على الأرجح من القوارض، وليس القروود غير البشرية. وتماشياً مع البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (UNAIDS)، ولتقليل الوصمة المرتبطة باسم الفيروس، تستخدم هيئة صحة أوريغون كلاً من hMPXV وجذري القروود للإشارة إلى هذا الفيروس والعدوى التي يسببها.

### س: كيف ينتشر هذا الفيروس؟

ينتقل جذري القروود (hMPXV) من شخص لآخر بشكل شائع عن طريق الاتصال المباشر بالطفح الجلدي أو قشور الجروح أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجذري القروود (hMPXV).

ويمكن أيضاً أن ينتقل جذري القروود (hMPXV) عن طريق لمس الأشياء والأقمشة والأسطح التي استخدمها شخص مصاب بجذري القروود (hMPXV) ومن خلال ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي، مثل اللعاب، لشخص مصاب بجذري القروود (hMPXV)، وهذا أقل شيوعاً.

### س: هل يمكن أن ينتشر جذري القروود (hMPXV) عن طريق الهواء؟

يبدو أن معظم حالات انتقال العدوى في الفترة الحالية ناتج عن ملامسة الجلد للجلد لفترة طويلة. وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لتحديد عدد مرات انتشار جذري القروود من خلال إفرازات الجهاز التنفسي. يمكن للشخص المريض الذي يسعل أو يعطس على شخص آخر أن ينقل العدوى إليه، على الرغم من أن هذا لم يتم تحديده على أنه الطريقة التي تنتقل بها العدوى حالياً. يبدو أن معظم حالات انتقال العدوى في الفترة الحالية يكون من التلامس المباشر للجلد مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم لشخص مصاب بجذري القروود (hMPXV).

### س: ما أعراض هذا الفيروس؟

يبدأ المرض عادةً بالإصابة بالحمى والقشعريرة والشعور بالتوعك وتورم الغدد. وفي نفس الوقت أو في غضون خمسة أيام، يظهر الطفح الجلدي. بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون الأعراض الأولى مجرد طفح جلدي. قد يبدأ ظهور الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية، في فتحة الشرج أو حولها، أو في الفم. ويمكن أن يؤثر أيضاً على جلد الوجه والذراعين والساقين والجذع. في البداية، يمكن أن يبدو الطفح الجلدي مثل بثور مع وجود جلد أحمر تحتها. ويمكن أن تكبر البثور قليلاً وتشكل فجوات وتمتلئ بسائل أو صديد. ثم عادةً ما تصير قشور. عادة ما يستغرق الأمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للشفاء مع نضارة البشرة.

### س: متى تظهر الأعراض بعد التعرض لشخص مصاب بالفيروس؟

عادةً في غضون 7 إلى 14 يوماً، في نطاق من 5 إلى 21 يوماً.

### س: متى يمكن لشخص مصاب بجذري القروود (hMPXV) أن ينقله للأشخاص الآخرين؟

قد ينقل الأشخاص المصابون بجذري القروود (hMPXV) العدوى من بداية ظهور الأعراض إلى أن يتم الشفاء من الطفح الجلدي. وعادةً ما يتطلب نقل العدوى للأخرين التلامس المباشر للجلد. يشمل الأشخاص

المعرضون لخطر متزايد الشركاء الجنسيين لشخص مريض بجذري القروود (hMPXV)، أو أفراد الأسرة والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يراعون شخصاً مصاباً بجذري القروود (hMPXV).

**س: هل يمكن للفيروس أن ينتشر قبل أن يعرف الشخص المصاب به أنه مريض؟**

لا توجد تقارير عن انتقال جذري القروود (hMPXV) قبل بدء الأعراض في الظهور. ومع ذلك، قد لا يشعر بعض الأشخاص المصابين بجذري القروود (hMPXV) بالمرض الشديد. قد يخلطون بين أعراضهم وعدوى أخرى (مثل كوفيد-19) أو قد لا يلاحظون الطفح الجلدي.

**س: هل يعد جذري القروود (hMPXV) مرضاً ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي؟**

جذري القروود (hMPXV) ليس مرضاً ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ينتقل الفيروس من خلال التلامس المباشر لجلد شخص مصاب بالقروح أو القشور أو سوائل الجسم للطفح الجلدي لشخص مصاب بجذري القروود (hMPXV). ويمكن أن يحدث هذا التلامس أثناء التقبيل والمعانقة والتدليك، وكذلك أثناء ممارسة الجنس.

**س: ما الذي يعتبر تعرضاً لفيروس جذري القروود (hMPXV)؟**

يُحتمل أن يكون الشخص قد تعرض للإصابة إذا حدث أي مما يلي خلال الوقت الذي كان فيه الشخص المصاب بجذري القروود (hMPXV) مريضاً ولا يزال يعاني من طفح جلدي:

- ملامسة الطفح الجلدي أو سوائل الجسم لشخص مصاب بجذري القروود (hMPXV)
- ممارسة الجنس عن طريق الفم أو الشرج أو المهبل مع شخص مصاب بجذري القروود (hMPXV)
- ملامسة الملابس المتسخة أو الفراش أو الضمادات أو الملابس الأخرى أو الأشياء الشخصية، بما في ذلك أدوات الألعاب الجنسية، التي يستخدمها شخص مصاب بجذري القروود (hMPXV)
- الأنشطة التي تؤدي إلى ملامسة الأكمال والأجزاء الأخرى من ملابس الفرد والآفات الجلدية للمريض أو سوائل الجسم، أو البياضات أو الضمادات المتسخة (على سبيل المثال، الدوران أو الاستحمام أو المساعدة في النقل) أثناء ارتداء القفازات ولكن دون ارتداء رداء
- التواجد دون ارتداء كامامة ضمن نطاق مسافة 6 أقدام لمدة 3 ساعات على الأقل مع شخص لا يرتدي كامامة مصاب بجذري القروود (hMPXV)

لمزيد من المعلومات حول حالات التعرض لجذري القروود (hMPXV) ومعرفة الأعراض التي يجب مراقبتها إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للفيروس، راجع [إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها \(CDC\) بشأن المراقبة وتقييم المخاطر](#).

س: ماذا إذا كنت أعتقد أنني مصاب بجذري القروذ (hMPXV)؟

احرص على الاتصال بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك لإبلاغه قبل أن تتوجه إلى العيادة. وإذا لم يكن لديك مقدم رعاية صحية، فاتصل على الرقم 1-1-2 ويمكن لأي شخص مساعدتك في العثور على عيادة أو مقدم رعاية صحية. كما يمكنك أيضًا التواصل مع هيئة الصحة العامة المحلية، والتي يمكنها فحصك في إحدى عياداتها.

إذا كنت تخطط للتوجه إلى غرفة الطوارئ أو إلى رعاية عاجلة، فأخبر موظفي تسجيل الوصول أنك قلق بشأن الإصابة بجذري القروذ (hMPXV). وسيطلبون منك ارتداء كمادة ومساعدتك على تغطية الطفح الجلدي الذي قد لا تغطيه ملابسك أثناء انتظارك للفحص.

## اللقاحات واستراتيجيات الوقاية الأخرى

س: هل يوجد لقاح مضاد لجذري القروذ (hMPXV) متاح في ولاية أوريغون؟

نعم، يتوفر في ولاية لقاح مضاد لجذري القروذ (hMPXV). ويُسمى هذا اللقاح باسم Jynneos.

س: كيف تستخدم ولاية أوريغون اللقاح المضاد لجذري القروذ (hMPXV)؟

يُعطى اللقاح في أقرب وقت ممكن بعد التعرض وقبل ظهور الطفح الجلدي، ويمكن استخدام اللقاح للوقاية من عدوى جذري القروذ (hMPXV) أو تقليل مدة استمرار الأعراض أو تقليل حدتها.

تستخدم ولاية أوريغون طريقتين لإعطاء اللقاح ضد جذري القروذ (hMPXV)، وهما:

1. إعطاء اللقاح للأشخاص الذين مخالطين لشخص مصاب بجذري القروذ (hMPXV) في ولاية

أوريغون أو أي مكان آخر في آخر 14 يومًا.

2. إعطاء اللقاح للأشخاص الذين من المرجح أن قد خالطوا شخص مصاب بجذري القروذ (hMPXV)

في آخر 14 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تستخدم ولاية أوريغون إستراتيجية تعطي الأولوية للجرعات الأولى لتوفير اللقاح لأكثر عدد ممكن من الأشخاص بينما تكون إمدادات اللقاح محدودة.

س: ما طريقة إعطاء اللقاح؟

تمت الموافقة مؤخرًا على إعطاء اللقاح Jynneos المضاد لجذري القروذ (hMPXV) داخل الأدمة للبالغين. ومع ذلك، تمت الموافقة على إعطاء اللقاح داخل الأدمة فقط للبالغين بعمر 18 عامًا أو أكبر. أما بالنسبة للأطفال أو البالغين الذين لديهم تاريخ من تكوين الجذرة (فرط نمو الأنسجة الندبية)، يمكنهم تلقي نفس لقاح جذري القروذ (hMPXV) الذي يُعطى كحقن تحت الجلد.

س: ما الذي يمكن أن أتوقعه من حيث الآثار الجانبية؟

يعاني الكثير من الأشخاص من الألم والاحمرار والتورم والحكة و/أو وجود كتلة صلبة في موضع الحقن. وفي بعض الأحيان لا تبدأ هذه الآثار الجانبية بالظهور على الفور، ولكن بعد حوالي 3 إلى 5 أيام من تلقي الحقنة. وقد تستمر ردود الفعل هذه أيضًا لعدة أيام. أما الآثار الجانبية الأقل شيوعًا هي قد يعاني الأشخاص من آلام في العضلات، وصداع، وإرهاق، وغثيان، وقشعريرة بعد أيام قليلة من تلقي الحقنة (ولكن ليس بنفس

السوء كما هو الحال مع لقاحات كوفيد-19). إذا كنت قلقًا بشأن الآثار الجانبية التي تشعر بها، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك أو إدارة الصحة المحلية.

### س: متى سيبدأ اللقاح في حمايتي من الإصابة بجذري القروود (hMPXV)؟

تبدأ الجرعة الأولى بالحماية من جذري القروود (hMPXV). كما يصنَّع معظم الأشخاص أجسامًا مضادة ضد جذري القروود (hMPXV) خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الجرعة الأولى، ولكن تبدأ الحماية القصوى بعد أسبوعين من الجرعة الثانية. ونوصي بأن يحصل الجميع على جرعة ثانية.

### س: متى سأحصل على الجرعة الثانية؟

في الوقت الحالي، نتأكد من أن أكبر عدد ممكن من الأشخاص يمكنهم الحصول على الجرعة الأولى. وسيحصل معظم الأشخاص على الجرعة الثانية بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الأولى. سيتلقى بعض الأشخاص الذين قد لا تستجيب أجسامهم للقاح أيضًا أو قد تكون معرضة لخطر الإصابة بعدوى جذري القردة الشديدة (hMPXV) الجرعة في غضون 4 أسابيع. سيتواصل معك فريق اللقاحات لتحديد موعد جرعة ثانية عندما يكون ذلك مناسبًا لك.

### س: هل يجب أن أتلقى اللقاح إذا كنت قد أصبت بالفعل بجذري القروود (hMPXV)؟

قد يتمتع الأشخاص المصابون بعدوى جذري القروود (hMPXV) بحماية قصيرة المدى من الإصابة بعدوى أخرى من جذري القروود (hMPXV). لا نعرف إلى متى تستمر هذه الحماية. وفي الوقت الحالي، لا نقدم لقاحًا للأشخاص الذين أصيبوا بجذري القروود (hMPXV) ولكنهم قد يتلقون لقاحًا في المستقبل.

### س: ماذا إذا تلقيت اللقاح ضد الجذري؟

نحن نقدم اللقاح بغض النظر عن التطعيم السابق ضد الجذري لأن الحماية التي يوفرها لقاح الجذري قد تنخفض بمرور الوقت.

### س: هل سيتعين عليّ الدفع مقابل الحصول على اللقاح؟

اللقاح نفسه مجاني ويغطي التأمين تكاليف إعطائه. بالإضافة إلى ذلك، لن يُطلب منك تقديم أي معلومات أو وثائق عن حالة الهجرة.

إذا لم تكن مؤهلاً للحصول على اللقاح الآن أو تنتظر جرعتك الثانية، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك ومجتمعك من الإصابة بفيروس hMPXV:

### المعرفة قوة

طالع الحقائق حول جذري القروود (hMPXV) من مصادر موثوقة. ويمكن للمعلومات أن تتغير بسرعة. تحدث إلى أشخاص تثق بهم في حياتك وأصدقائك وشركائك في الجنس.

### محاربة وصمة العار

أي شخص يمكن أن يُصاب بفيروس جذري القروود (hMPXV). وليس هناك عيب في اكتشاف إصابتك بجذري القروود (hMPXV). إذ يتعلم الكثير منا لأننا نتخذ خطوات استباقية لرعاية صحتنا والحفاظ على مجتمعنا آمنًا.

تمنعنا الشعور بوصمة العار من الوصول إلى الرعاية الصحية، والاتصال بشركائنا الجنسيين، وتضر بصحتنا العقلية. من الأهمية بمكان أن نعتني بأنفسنا وبيعضنا البعض.

### التعرف على طريقة انتقال جدري القروود (hMPXV)

لا يعد جدري القروود (hMPXV) عدوى أو مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ينتقل جدري القروود (hMPXV) أثناء مخالطة شخص مصاب وملامسة جلد شخص به طفح جلدي مصاب بجدري القروود (hMPXV). ويمكن أن تحدث هذه الملامسة أثناء أنشطة مثل التقبيل والعناق والتدليك والرقص الملامس للجلد وممارسة الجنس.

### معرفة الأعراض

احرص على أن تفحص جسمك باستمرار. تشمل الأعراض طفح جلدي وتقرحات وبثور ويقع جديدة. كما يصاب بعض الأشخاص أيضًا بالحمى، أو الصداع، أو تورم الغدد والشعور بألم بها، أو آلام العضلات، أو الإرهاق.

إذا كنت لا تشعر بأنك على ما يرام، أو تعاني من طفح جلدي أو أعراض أخرى مقلقة، فتجنب مخالطة الآخرين وملامسة جلد الآخرين، وتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن. واحرص على توعية الآخرين بانتشار جدري القروود (hMPXV) في ولاية أوريغون. بينما يتعافى معظم الأشخاص بأمان في المنزل، يتوفر العلاج لمزيد من الأشخاص المصابين أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض أكثر خطورة. ويمكن أن يساعدك مقدم الرعاية الصحية في تحديد ما إذا كان العلاج مناسبًا لك.

يمكن أن تكون [إدارة](#) الصحة المحلية أيضًا مصدرًا مفيدًا للمعلومات والاختبار والعلاج والحصول على اللقاح لك و/أو لشركائك.

### وضع خطط مستقبلية

عند التفكير في حضور مهرجان أو حفلة موسيقية أو حفلة أو أي مناسبة أخرى، ضع في اعتبارك مقدار مخالطة الآخرين وملامس جلد الآخرين التي قد تحدث. فعلى سبيل المثال، تعتبر الفعاليات الرياضية أو الحفلات الموسيقية التي يُرجح أن يرتدي فيها الناس ملابس كاملة ومن غير المحتمل أن يكون لديهم ملامسة لجلدهم أكثر أمانًا مقارنة بالنوادي والحفلات التي يرتدي فيها الأشخاص الحد الأدنى من الملابس وغالبًا ما يكون هناك تلامس عن طريق الجلد، أو التواجد في الأماكن مثل غرف الساونا أو الحمامات أو النوادي الجنسية حيث يوجد حد أدنى من الملابس أو منعدمة وغالبًا ما يكون هناك اتصال جنسي.

عند التفكير في الجنس، تحقق مع شركائك في الجنس. وأخبرهم بما تشعر به، سواء كنت قد أصبت بمرض أو طفح جلدي مؤخرًا، خاصة على الأعضاء التناسلية أو حول فتحة الشرج، واطلب منهم فعل الشيء نفسه. أمسك امرأة أو هاتفك للنظر إلى الجلد حول فتحة الشرج والأعضاء التناسلية. إذا كنت أنت أو شريكك مريضًا مؤخرًا أو مريضًا حاليًا أو ظهرت عليكما أي طفح جلدي جديد، فتجنب المخالطة وملامسة الجلد وتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية.

يعد التواصل المفتوح مع الشركاء وتجنب ممارسة الجنس أثناء مرضك ممارسات جيدة بشكل عام.

إذا اخترت ممارسة الجنس، فاختر الأنشطة التي لا تنطوي على ملامسة أو تقبيل مباشر، وتغطية الطفح الجلدي، وغسل اليدين، والمناشف، والفراش، وألعاب الجنس، وغيرها من المعدات على الفور، وفكر في الحد من عدد شركائك. وفكر في تشكيل قطيع. اختر شخصاً واحداً أو مجموعة صغيرة من الأشخاص واتفق على عدم ممارسة الجنس إذا كنت تشعر بالتوعك أو لاحظت أي طفح جلدي جديد.

حتى إذا كنت في لقاءات مع أشخاص لا تعرفهم، فخطط للاحتفاظ برقم هاتف (أو أي شكل آخر من معلومات الاتصال) لشركائك فقط في حالة احتياجك للاتصال لاحقاً. وبهذه الطريقة يمكنك الاتصال بهم لإخبارهم بكيفية إجراء اختبارات للكشف عن جدري القروود (hMPXV) أو تلقي اللقاح إذا كانوا مؤهلين.

إذا كنت قلقاً من تعرضك لجدري القروود (hMPXV)، فتواصل مع وكالة الصحة العامة المحلية للتحدث خلال التعرض لتحديد الخطوة التالية الأفضل.

### **الاتصال المسبق**

إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من أعراض مرتبطة بجدري القروود (hMPXV)، فأخبر مقدم الرعاية الصحية المتابع لك قبل الذهاب إلى العيادة للحصول على الرعاية. وإذا كنت تخطط لاستخدام رعاية عاجلة أو الذهاب إلى غرفة طوارئ، فأخبر موظفي تسجيل الوصول أنك تعتقد أنك قد تكون مصاباً بجدري القروود (hMPXV). وسيطلبون منك ارتداء كامامة ويساعدونك على تغطية أي طفح جلدي على الجلد المكشوف أثناء انتظار الحصول على الرعاية.

### **الإبقاء على اطلاع**

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول جدري القروود (hMPXV) على المواقع الإلكترونية التالية.

- [مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها](#)
- [هيئة صحة أوريغون](#)
- [إدارة الصحة في مقاطعة Multnomah](#)
- [PRISM و Cascade AIDS Project](#)
- [هيئة الصحة العام في مقاطعة Lane](#)
- [إدارة الصحة في مقاطعة Washington](#)
- [إدارة الصحة في مقاطعة Clackamas](#)

## الاستجابة للانتشار الحالي للفيروس

س: كيف تستجيب هيئة صحة أوريغون لتفشي المرض؟

تعمل هيئة صحة أوريغون مع سلطات الصحة العامة المحلية والقبائل والشركاء المجتمعيين لتخصيص إمدادات من اللقاح المضاد لجذري القروود (hMPXV) ومشاركة المعلومات حول استراتيجيات الوقاية من جذري القروود (hMPXV) وتفشي المرض والوقاية من العدوى مع الأشخاص الذين قد يكونون في خطر متزايد للإصابة بالعدوى.

كما تشارك هيئة صحة أوريغون أيضًا المعلومات مع الأطباء حول تفشي المرض، وكيفية التعرف على مرض جذري القروود واختباره، وكيفية منع انتشاره.

أنشطة إضافية:

- قدمت هيئة صحة أوريغون معلومات للجمهور حول الأعراض وعوامل الخطر لعدوى جذري القروود (hMPXV)، وطلب الرعاية إذا ظهرت هذه الأعراض.
- يجري مختبر الصحة العامة بولاية أوريغون اختبارًا أوليًا وترتيب الاختبارات التأكيدية لجذري القروود (hMPXV) من خلال مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
- تزود هيئة صحة أوريغون المقاطعات والأنظمة الصحية باللقاح حتى يتمكنوا من مساعدة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى على حماية أنفسهم.

**إمكانية الوصول إلى المستند:** بالنسبة للأفراد ذوي الإعاقات أو الأفراد الذين يتحدثون لغةً أخرى غير الإنجليزية، يمكن أن توفر هيئة صحة أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة بالأحرف الكبيرة أو الكتابة بطريقة برايل. اتصل بوحدة اتصالات كوفيد-19 على الرقم 1-971-673-2411، الهاتف النصي (TTY) على الرقم 711 أو [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us).