

# COVID-19 백신 및 안전: 이점 및 위험이해



## 존슨앤존슨 백신 위험 대비 이점

### ✓ 이점

- 1회 접종 백신
- COVID-19로 인한 입원과 사망을 예방하는 데 매우 효과적임
- COVID-19로 인한 신부전, 심부전, 폐 질환, 혈전 및 기타 장기적인 영향을 예방함
- mRNA 백신에 알레르기가 있고 mRNA 시리즈의 2차 접종을 받을 수 없는 사람들을 위한 옵션

### ⚠ 위험

- 일종의 응고 장애에 걸릴 위험이 낮습니다. 백신 접종을 받은 백만 명 중 약 3명에게서 발생했습니다.
- 만 18-49세 여성에게서 더 위험이 높음: 이 연령대에서 백만 명 중 8.8명

### 이 위험에 대해 생각하는 방법

존슨앤존슨 백신의  
혈전 위험  
백만 명 중 3명

COVID-19의  
혈전 위험  
2500배 이상

엄격한 검사를 거친 후 안전 전문가들은 매우 드물게 발생하는 위험보다 백신의 이점이 더 크다고 결정했습니다.

## 저는 존슨앤존슨 백신을 맞았습니다. 혈전이 생길 수 있습니까?

위험이 매우 낮다는 것을 기억하십시오. 주사를 맞은 후 3주 이내에, 다음과 같은 증상이 있는 경우 담당 의사와 상담하십시오:

- 새로운 두통(평소보다 훨씬 심함)
- 가슴 통증이나 압박감
- 숨이 참
- 새로이 발생하거나 심해진 허리 통증
- 복통
- 새로운 멍
- 손과 정강이에 작은 빨간색 반점이나 갈색 반점



의료 서비스 제공자가 귀하에게 응급 치료를 받도록 요청할 수 있습니다.

## 드문 부작용: 모든 백신

- 심한 알레르기 반응 또는 아나필락시스, 호흡 곤란, 이후 부종은 모든 COVID-19 백신의 드문 부작용입니다. 백신 접종 후 15-30분 동안 관찰을 하여 백신 제공자가 귀하의 상태가 괜찮은지 확인할 수 있도록 해야 합니다.
- 백신 접종을 받기 전에 음식이나 약에 대한 알레르기가 있는 경우 백신 제공자에게 이를 알려주세요.
- 안전 보고 시스템을 통해, 우리는 전국적으로 화이자 및 모더나 백신의 부작용 발생률이 백만 명 중 2 ~ 5명임을 알고 있습니다. 오리건주에서, 입원 데이터에 따르면 백만 명 중 10명에서 부작용이 발생합니다. 존슨앤존슨 백신:에 대한 데이터는 아직 없습니다.



**문서 접근성:** 장애인 또는 영어 이외의 언어를 사용하는 분들을 위해, OHA는 번역, 큰 글자 또는 점자와 같이 다른 형태로 된 정보를 제공할 수 있습니다. 건강정보센터(1-971-673-2411, 711 TTY 또는

[COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us))로 문의하십시오.

OHA

3722(5/13/2021) KOREAN