



## 부스터샷, 면역 저하자를 위한 3 차 접종

(업데이트: 2022년 1월 11일)

가장 최신 정보는 <https://govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid-19-vaccine> 에서 확인하시기 바랍니다.

### 권장하는 부스터샷

세 가지 COVID-19 백신 모두 아래 나열된 집단에서 백신 접종을 완료한 사람들을 위한 부스터샷으로 제공됩니다. 부스터샷으로 접종받을 백신을 선택할 수 있으며, COVID-19 백신을 제공하는 대부분의 장소에서 부스터샷을 접종받을 수 있습니다.

백신	다음 집단의 사람들에게 권장됨	시기
<b>화이자</b> 0.3 mL 1 차 접종 0.3 mL 2 차 접종 0.3 mL 부스터샷	<ul style="list-style-type: none"> <li>만 12 세 이상</li> <li>이제 부스터샷은 면역력이 저하되어 있고 3 차 접종을 받은 만 12 세 이상의 사람에게 권장됩니다.</li> </ul>	2 차 접종일로부터 최소 5 개월 후에 부스터샷 접종
<b>모더나</b> 0.5 mL 1 차 접종 0.5 mL 2 차 접종 0.25 mL 부스터샷	<ul style="list-style-type: none"> <li>만 18 세 이상</li> <li>이제 부스터샷은 면역력이 저하되어 있고 3 차 접종을 한 만 18 세 이상의 사람에게 권장합니다.</li> </ul>	2 차 접종일로부터 최소 5 개월 후에 부스터샷 접종
<b>존슨앤드존슨</b> 0.5 mL 1 차 접종 0.5 mL 부스터샷	<ul style="list-style-type: none"> <li>만 18 세 이상</li> <li>이제 부스터샷은 면역력이 저하되어 있고 존슨앤드존슨 백신을 접종한 만 18 세 이상의 사람에게 권장합니다.</li> </ul>	1 차 접종을 하고 최소 2 개월 후 부스터샷 접종을 권장함

## 면역력이 약화된 경우에 3 차 접종

면역력이 약화된 경우, 2 차 접종을 하고 최소 28 일 후에 mRNA 백신 3 차 접종을 받아야 합니다.

백신	다음 집단의 사람들에게 권장됨	시기
<b>화이자</b> <b>만 12 세 이상</b> 0.3 mL 1 차 접종 0.3 mL 2 차 접종 0.3 mL 3 차 접종  만 5~11 세 소아 용량 0.2 mL 1 차 접종 0.2 mL 2 차 접종 0.2 mL 3 차 접종	COVID-19 에 특히 취약한 5 세 이상의 <u>중등도에서 중증의 면역력 저하자.</u>	2 차 접종일로부터 최소 28 일 후
<b>모더나</b> 0.5 mL 1 차 접종 0.5 mL 2 차 접종 0.5 mL 3 차 접종	COVID-19 에 특히 취약한 <u>중등도에서 중증의 면역력 저하자.</u>	2 차 접종일로부터 최소 28 일 후
<b>존슨앤드존슨</b>	존슨앤드존슨 백신을 접종한 모든 사람은 백신 접종일로부터 2 개월 후에 3 개의 승인된 백신 중 하나로 부스터샷을 접종하는 것이 적극 권장됩니다.	해당 없음

**문서 접근성:** 장애인 또는 영어 이외의 언어를 사용하는 분들을 위해, OHA 는 번역본, 큰 글자 인쇄물 또는 점자와 같이 다른 형태로 정보를 제공할 수 있습니다. COVID-19 커뮤니케이션 부서에 1-971-673-2411, 711 TTY 또는 [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us) 로 연락하십시오.