



COVID-19 백신 접종

COVID-19 백신	1차 접종	2차 접종	3차 접종* (면역력이 약화된 경우에 한함)	부스터샷 접종*
화이자 소아(5~11세)	0.2mL	0.2mL	0.2mL	FDA 또는 CDC가 권장하지 않음
화이자(12세 이상)	0.3mL	0.3mL	0.3mL	0.3mL(12세 이상, 2차 접종 5개월 후)
Moderna(18세 이상)	0.5mL	0.5mL	0.5mL	0.25mL(18세 이상, 2차 접종 5개월 후)
얀센 (존슨앤드존슨, 18세 이상)	0.5mL		FDA 또는 CDC가 권장하지 않음	0.5mL(18세 이상, 1차 접종 2개월 후)

*CDC는 12세 이상의 모든 사람들이 화이자 또는 모더나 백신 2차 접종일로부터 5개월 후 또는 얀센(존슨앤드존슨) 백신 1회 접종일로부터 2개월 후 부스터샷을 접종하도록 권장합니다. 이에는 면역력이 저하되고 화이자 또는 모더나 백신 3차 접종을 받는 사람들이 포함됩니다.

문서 접근성: 장애인 또는 영어 이외의 언어를 사용하는 분들을 위해, OHA는 번역본, 큰 글자 인쇄물 또는 점자와 같이 다른 형태로 정보를 제공할 수 있습니다. COVID-19 커뮤니케이션 부서에 1-971-673-2411, 711 TTY 또는 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us로 연락하십시오.