

COVID-19 백신 접종

COVID-19 백신	1차 접종	2차 접종	3차 접종	추가 접종 ¹ (면역력이 약화된 경우에 한함)	부스터샷 ²
모더나 일가 소아 기본 접종 시리즈 (생후 6개월~만 5세)	0.25mL (질은 청색 마개, 자홍색 라벨 테두리)	0.25mL	해당 없음	0.25mL	해당 없음
화이자 일가 소아 기본 접종 시리즈 (생후 6개월~만 4세)	0.2mL (고동색 마개)	0.2mL	0.2mL	해당 없음	해당 없음
화이자 소아 기본 접종 시리즈 (만 5세~11세)	0.2mL (주황색 마개)	0.2mL	해당 없음	0.2mL	0.2mL
모더나 일가 소아 기본 접종 시리즈(만 6~11세)	0.5mL (질은 청색 마개, 청록색 또는 자주색 라벨 테두리)	0.5mL	해당 없음	0.5mL	해당 없음
화이자 이가 부스터샷(만 5~11세)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	0.2mL(주황색 마개, 주황색 라벨 테두리)
모더나 이가 부스터샷(만 6~11세)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	0.5mL(질은 청색 마개, 회색 라벨 테두리)
화이자 일가 기본 접종(만 12세 이상)	0.3mL (회색 마개)	0.3mL	해당 없음	0.3mL	이 제제는 부스터샷으로 승인되지 않았습니다. 아래의 이가 부스터샷 옵션을 참조하십시오.
모더나 일가 기본 접종(만 12세 이상)	0.5mL	0.5mL	해당 없음	0.5mL	이 제제는 부스터샷으로 승인되지 않았습니다. 아래의

	(적색 마개, 연한 청색 라벨 테두리)				이가 부스터샷 옵션을 참조하십시오.
화이자 이가 부스터샷(만 12세 이상)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	0.3mL(회색 마개)
모더나 이가 부스터샷(만 12세 이상)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	0.5mL(짙은 청색 마개, 회색 라벨 테두리)
존슨앤드존슨(만 18세 이상)	0.5mL	해당 없음	해당 없음	아래 참고사항 참조	아래 참고사항 참조
노바백스 ³ (만 12세 이상)	0.5mL	0.5mL	해당 없음	해당 없음	해당 없음

참고: 면역력이 저하되었고 존슨앤드존슨 백신을 접종한 사람은 최초 접종 후 최소 28일이 지난 시점에 일가(원래 공식 백신) mRNA 백신(화이자 또는 모더나)을 추가로 접종해야 합니다. 그 후 추가 접종을 받고 최소 2개월이 지난 후 또는 가장 최근에 일가 부스터샷 접종을 받고 최소 2개월이 지난 후에 이가(업데이트된 공식 백신) mRNA 백신의 부스터샷을 접종해야 합니다.

¹ CDC는 면역력이 저하되었고 화이자(만 5세 이상) 또는 모더나(생후 6개월 이상)를 접종한 사람들이 2차 접종 후 최소 28일이 지나서 추가(일가) 접종을 받을 것을 권장합니다. 면역력 저하자의 추가 접종은 기본 백신 접종의 일부입니다. 생후 6개월~만 4세 아동들에게 화이자 백신 추가 접종은 지금 현재 권장되지 않습니다.

² CDC는 화이자 또는 모더나를 접종받은 만 5세 이상의 모든 사람들과 존슨앤드존슨을 접종받은 만 18세 이상의 모든 사람들이 적합한 경우—즉, 기본 접종 시리즈(면역저하자들에게 필요한 경우 추가 접종 포함) 완료 후 최소 2개월 또는 가장 최근 일가 부스터샷 접종 후 2개월 시점에 이가 모더나 또는 화이자 부스터샷을 접종받도록 권장합니다.

³ 면역저하자에 대한 추가 접종은 현재 노바백스 백신 접종자에 대해 권장하지 않고 있습니다.

문서 접근성: 장애인 또는 영어 이외의 언어를 사용하는 분들을 위해, OHA는 번역본, 큰 글자 인쇄물 또는 점자와 같이 다른 형태로 정보를 제공할 수 있습니다. COVID-19 커뮤니케이션 부서(971-673-2411, 711 TTY 또는 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us)에 문의하시기 바랍니다.