



## 몰누피라비르에 대한 사실 자료: COVID-19 치료용 의약품

### (환자, 부모 및 간병인용)

#### Q: 몰누피라비르란 무엇입니까?

몰누피라비르는 경증에서 중등도의 COVID-19 환자를 치료하기 위한 약입니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2021년 12월 이 약의 사용을 최초로 승인했습니다.

#### Q: 누가 몰누피라비르를 투여받을 수 있습니까?

몰누피라비르는 다음에 해당하는 경증에서 중등도의 COVID-19 증상이 있는 사람들을 위한 것입니다.

- 만 18세 이상,
- COVID-19 검사에서 양성 판정을 받은 경우,
- 중증 COVID-19 질환에 걸릴 위험이 높은 경우, 그리고
- FDA에서 허가한 다른 치료 옵션에 접근할 수 없는 경우.

#### Q: 이 약은 어떻게 투여합니까?

몰누피라비르는 경구로 복용합니다. 일반적인 복용량은 5일 동안 12시간마다 4정입니다. 5일 간의 전체 치료 과정을 완료하고 공중 보건 권장 사항에 따라 계속 격리 조치를 취하는 것이 중요합니다. 이 약은 5일 이상 복용해서는 안 됩니다.

#### Q: 몰누피라비르를 투여해서는 안 되는 사람은 누구입니까?

몰누피라비르는 다음과 같은 환자에게 권장하지 않습니다.

- 임신한 환자
- 모유 수유 중인 환자
- 어린이 환자

임신 중이거나 모유 수유 중인 경우, 몰누피라비르를 복용하기 전에 의료 서비스 제공자와 상담하십시오.

임신 가능한 상태에서 이 약을 복용할 경우, 신뢰할 수 있는 피임 방법을 사용하십시오. 몰누피라비르의 마지막 투여 후 최소 3개월 동안 계속 피임을 하십시오.

**Q: 몰누피라비르의 가능한 부작용은 무엇입니까?**

이 약의 부작용은 다음과 같습니다.

- 설사
- 구역질
- 현기증

**Q: 몰누피라비르의 투약 대상이 아닌 것은 무엇입니까?**

몰누피라비르의 투약 대상이 아닌 것:

- 위중증 COVID-19 질환으로 인해 입원이 필요한 환자의 초기 치료
- COVID-19 질환 예방.

**Q: 추가 정보**

질문이 있는 경우, 의료 서비스 제공자에게 문의하거나, 몰누피라비르 웹사이트([www.molnupiravir.com](http://www.molnupiravir.com))를 방문하거나, 1-800-672-6372번으로 전화하십시오.

문서 접근성: 장애인 또는 영어 이외의 언어를 사용하는 분들을 위해, OHA는 번역본, 큰 글자 인쇄물 또는 점자와 같이 다른 형태로 정보를 제공할 수 있습니다. 건강정보센터(1-971-673-2411, 711 TTY 또는 [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us))로 문의하십시오.