



## 팍스로비드에 대한 사실 자료: COVID-19 치료용 의약품

### (환자, 부모 및 간병인용)

#### Q: 팍스로비드란 무엇입니까?

팍스로비드는 경증에서 중등도의 COVID-19 환자를 치료하기 위한 약입니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2021년 12월 이 약의 사용을 최초로 승인했습니다.

#### Q: 누가 팍스로비드를 투여받을 수 있습니까?

팍스로비드는 다음에 해당하는 경증에서 중등도의 COVID-19 증상이 있는 사람들을 위한 것입니다.

- 체중이 88파운드(40kg) 이상인 만 12세 이상의 성인이나 어린이인 경우,
- COVID-19 검사에서 양성 판정을 받은 경우, 그리고
- 중증 COVID-19 질환에 걸릴 위험이 높은 경우.

#### Q: 이 약은 어떻게 투여합니까?

팍스로비드는 경구로 복용합니다. 일반적인 복용량은 5일 동안 하루에 두 번 3정입니다. 5일 간의 전체 치료 과정을 완료하고 공중 보건 권장 사항에 따라 계속 격리 조치를 취하는 것이 중요합니다. 팍스로비드는 5일 이상 복용해서는 안 됩니다.

#### Q: 팍스로비드를 투여해서는 안 되는 사람은 누구입니까?

팍스로비드는 다음 증상이 있는 환자에게 권장하지 않습니다.

- 중증 간 질환
- 중증 신장 질환
- 이 약의 모든 성분에 대한 강한 알레르기

위의 증상을 가진 환자 또는 제대로 관리되지 않는 HIV에 감염된 환자는 팩스로비드를 복용하기 전에 의료 서비스 제공자와 상담해야 합니다.

**Q: 팩스로비드의 가능한 부작용은 무엇입니까?**

이 약의 부작용은 다음과 같습니다.

- 미각의 변화 또는 손상
- 설사
- 혈압 상승
- 근육통

또한 팩스로비드 다른 의약품과 상호 작용할 수 있습니다. 이는 때때로 생명을 위협하는 반응을 일으킬 수 있습니다. 팩스로비드를 복용하기 전에 사용하는 모든 의약품에 대해 의료 서비스 제공자에게 알려주세요. 처방전 없이 살 수 있는 의약품과 허브 보조제를 여기에 추가해 주십시오.

**Q: 팩스로비드의 투여 대상이 아닌 것은 무엇입니까?**

팩스로비드의 투여 대상이 아닌 것:

- 위중증 COVID-19 질환으로 인해 입원이 필요한 사람들의 초기 치료
- COVID-19 감염 예방.

**Q: 추가 정보**

질문이 있는 경우, 의료 서비스 제공자에게 문의하거나, 팩스로비드 웹사이트([www.COVID19oralRx.com](http://www.COVID19oralRx.com))를 방문하거나, 1-877-219-7225번으로 전화하십시오.

**문서 접근성:** 장애인 또는 영어 이외의 언어를 사용하는 분들을 위해, OHA는 번역본, 큰 글자 인쇄물 또는 점자와 같이 다른 형태로 정보를 제공할 수 있습니다. 건강정보센터(1-971-673-2411, 711 TTY 또는 [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us))로 문의하십시오.