



COVID-19 백신과 접종자

추가 접종, 부스터샷 접종 및 COVID-19 예방 약물에 관한 업데이트
발행 1/13/2022, 개정 3/7/2022

추가 COVID-19 백신 접종

OHA HIV/STD/TB 섹션은 화이자/바이오엔텍 또는 모더나 COVID-19 백신을 2회 접종했고 HIV가 있는 만 5세 이상의 사람이 2차 접종 후 최소 28일이 지나서 추가 접종을 받을 것을 권장합니다. 또한 J&J/얀센 백신의 1차 접종 후 최소 28일이 지나서 화이자/바이오엔텍 또는 모더나 COVID-19 백신의 추가 접종을 권장합니다.

우리는 HIV에 감염된 모든 사람이 COVID-19 백신의 추가 접종을 받을 수 있고, 아래 나열된 특성을 가진 사람들이 첫 번째 백신 시리즈의 일부로 COVID-19 백신의 추가 접종을 받을 것을 권고합니다. 연구에 따르면 백신 접종 당시 다음과 같은 특성을 가진 사람들은 COVID-19에 대한 방어적 면역 반응을 형성하기 위해 추가 접종이 필요합니다.

- HIV 치료를 받고 있지 않은 경우
- HIV 감염의 증상이 있는 경우
- CD4 수가 350cells/mL 미만인 경우
- HIV 치료를 시작한 후 CD4 수가 적절하게 증가하지 않은 HIV 관련 악성 종양(예: 림프종, 카포시 육종 또는 자궁경부암 또는 항문암)이 있는 경우
- HIV 치료를 시작한 후 CD4 수가 적절하게 증가하지 않은 기회 감염(예: 폐포자충 폐렴[PJP 또는 PCP], 크립토코쿠스 수막염, TB 또는 독소플라스마증)이 있는 경우
- 암 치료를 받고 있는 경우
- 골수 또는 고행 장기 이식을 받은 적이 있는 경우
- 면역 체계를 억제하는 약물(예: 고용량의 프레드니손, 메토틱렉세이트, 휴미라 또는 레미케이드)을 복용하는 경우
- 투석이 필요한 신장 질환이 있는 경우
- 만 65세 이상인 경우

COVID-19 부스터샷 접종

방어적 면역 반응을 형성하는 데 도움이 되는 추가 접종과 대조적으로, 부스터샷 접종은 우리가 백신으로부터 얻는 보호 기능을 높이고 강력하게 유지합니다. 만 12세 이상의 모든 사람은 첫 번째 mRNA 백신 시리즈(화이자/바이오엔텍 또는 모더나)의 마지막 접종 후 최소 3개월이 지나서 COVID-19 백신의 부스터샷 접종을 받을 것을 권장합니다. J&J/얀센 백신을 접종한 사람은 마지막 접종 후 최소 2개월이 지나서 자신이 선택한 백신의 부스터샷을 접종할 것을 권장합니다(mRNA 부스터샷이 바람직함). 첫 번째 백신 시리즈에는 위의 첫 문단에서 설명한 것과 같은 추가 COVID-19 백신 접종이 포함됩니다.

부스터샷 접종은 COVID-19의 오미크론 변이 바이러스로 인한 심한 질환에 대한 보호를 제공하고 HIV 감염자들 간에 더 일반적일 수 있는 [COVID-19 돌과 감염](#)의 위험을 줄여 주기 때문에 중요합니다.

다음 가이드에 따라 먼저 접종을 받은 백신에 기초하여 어떤 백신을 접종하고 언제 접종해야 하는지 결정할 수 있습니다. 어떤 백신을 언제 접종해야 하는지에 대해 질문이 있는 경우, 주저하지 말고 의료팀과 상의하십시오.

HIV 감염자를 위한 COVID-19 백신 가이드

화이자/바이오엔텍 백신을 먼저 2회 접종하고 다음에 해당하는 경우:	두 번째 접종을 하고 최소 28일 후에 다음 백신으로 추가 접종을 할 것을 권고함:	마지막 접종을 하고 최소 3개월 후에 다음 백신으로 부스터샷 접종:
만 5~11세의 경우	화이자/바이오엔텍	부스터샷이 아직 승인되지 않음
만 12~17세의 경우	화이자/바이오엔텍	화이자/바이오엔텍
만 18세 이상	모더나 또는 화이자/바이오엔텍	모더나 또는 화이자/바이오엔텍
첫 번째 백신 시리즈		부스터샷

모더나 백신을 먼저 2회 접종하고 다음에 해당하는 경우:	두 번째 접종을 하고 최소 28일 후에 다음 백신으로 추가 접종을 할 것을 권고함:	마지막 접종을 하고 최소 3개월 후에 다음 백신으로 부스터샷 접종:
만 18세 이상	모더나 또는 화이자/바이오엔텍	모더나 또는 화이자/바이오엔텍
첫 번째 백신 시리즈		부스터샷

J&J/얀센 백신을 먼저 1회 접종하고 다음에 해당하는 경우:	1차 접종을 하고 최소 28일 후에 다음 백신으로 추가 접종을 할 것을 권고함:	마지막 접종을 하고 최소 2개월 후에 다음 백신으로 부스터샷 접종:
만 18세 이상	모더나 또는 화이자/바이오엔텍	J&J/얀센, 모더나 또는 화이자/바이오엔텍. 모더나 또는 화이자/바이오엔텍이 바람직합니다.
첫 번째 백신 시리즈		부스터샷

COVID-19를 예방하기 위한 약물

2021년 12월 8일, FDA는 현재 COVID-19에 감염되지 않았거나 최근에 COVID-19에 노출된(HIV에 대한 사전 노출 예방 등) 만 12세 이상의 사람들에서 COVID-19 감염을 예방하기 위해 지속성 약물인 [이부실드](#)에 대한 긴급 사용을 승인했습니다. 이 약물은 면역력이 저하된 사람(위의 "COVID-19 백신 추가 접종" 섹션에 기재된 특성으로 정의)으로서 백신 접종 후 신체에서 방어적 면역 반응을 형성할 수 없거나 COVID-19 백신에 대한 심각한 부작용의 병력이 있는 사람을 위한 것입니다.

이부실드는 단일 클론 항체라는 두 가지 약물의 조합입니다. 단일 클론 항체는 실험실에서 만들어진, 감염으로부터 우리를 보호할 수 있는 단일 버전의 단백질입니다. 이부실드에는 COVID-19로부터 우리를 보호하는 두 가지 다른 단백질이 포함되어 있습니다. 이 약물은 2회 개별 주사로 차례로 근육에 투여되며 최대 6개월 동안 COVID-19에 대한 보호 기능을 제공할 수 있습니다.

이부실드를 통한 사전 노출 예방은 백신 접종을 받을 자격이 있는 사람들의 COVID-19 백신 접종을 대체하는 것이 아닙니다. 현재 OHA는 HIV에 감염된 사람들이 무료로 이 약물을 투여할 수 있도록 주 전역의 HIV 제공자와 협력하고 있습니다.

추가 정보

백신 접종을 받을 수 있는 곳을 포함하여 COVID-19 및 COVID-19 백신에 대한 보다 자세한 정보는 OHA의 [COVID-19 및 HIV 웹페이지](#)의 이전 FAQ와 OHA의 COVID-19 백신 접종 [페이지](#)를 참조하십시오. 이 문서의 정보는 COVID-19 백신 접종을 받는 것을 포함하여 COVID-19로부터 여러분 자신을 보호하는 최선의 방법에 대한 의료 팀과의 상담 내용에 추가되지만 이를 대체하지는 않습니다.

문서 접근성: 장애인 또는 영어 이외의 언어를 사용하는 분들을 위해, OHA는 번역본, 큰 글자 인쇄물 또는 점자와 같이 다른 형태로 정보를 제공할 수 있습니다. COVID-19 커뮤니케이션 부서에 1-971-673-2411, 711 TTY 또는 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us로 연락하십시오.