

ຄູ່ມືການເກັບຂໍ້ກະເທີ

ທ່ານຈະຕ້ອງມີ...



ຫຼອດເກັບ



ຖົງປລາສຕິກ



ຖົງເຈ້ງ



1 ຕົ້ນນອນ



2 ຫາຍໃຈເລິກໆ 3 ຄັ້ງ



3 ໄອເອົາຂໍ້ກະເທີອອກມາ



4 ຖິ້ມຂໍ້ກະເທີໃສ່ໃນຫຼອດ



5 ຢ່າເອົາປາກກວາງເທິງຫຼອດ



6 ໝູນຝາປິດຫຼອດ



7 ຕິດຊື່ແລະວັນທີໄວ້ເທິງຫຼອດ



8 ເອົາຫຼອດໃສ່ໃນຖົງປລາສຕິກ



9 ເອົາຖົງປລາສຕິກໃສ່ໃນຖົງເຈ້ງ




10 ເອົາຖົງເຈ້ງແຂ່ໃນຕູ້ເຢັນ



11 ຖິ້ມຂໍ້ກະເທີໃສ່ 1 ຫຼອດຕໍ່ມື້ເປັນເວລາ 3 ມື້

ຄໍາແນະນຳສໍາລັບການເກັບຂໍ້ກະເທີສໍາລັບວັນນະໂຮກ



ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ
ຈຳເປັນຕ້ອງມີ
ການກວດ
ຂໍ້ກະເທີ?

ໝໍຂອງທ່ານຕ້ອງການເກັບຕົວຢ່າງຂອງຂໍ້ກະເທີ ທີ່ທ່ານໄອອອກມາຈາກປອດຂອງທ່ານ. ຫ້ອງທົດລອງຈະທົດສອບຂໍ້ກະເທີເພື່ອກວດຫາເຊື້ອພະຍາດວັນນະໂຮກ (TB).

ການກວດຂໍ້ກະເທີຂອງທ່ານເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກວດເບິ່ງວ່າທ່ານເປັນພະຍາດວັນນະໂຮກ ຫຼືບໍ່. ຖ້າວ່າ ທ່ານກຳລັງກິນຢາຮັກສາວັນນະໂຮກຢູ່ແລ້ວ, ການກວດຂໍ້ກະເທີຂອງທ່ານເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າ ຢາທີ່ກິນນັ້ນໃຊ້ໄດ້ຜົນດີບໍ່.

ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ການກວດທົດສອບຖືກຕ້ອງແມ່ນຍຳ, ທ່ານຕ້ອງໄອໃຫ້ຂໍ້ກະເທີອອກມາຈາກສ່ວນເລິກໃນປອດຂອງທ່ານ. ທຳມະດາແລ້ວຂໍ້ກະເທີຈາກປອດຂອງທ່ານມັກໜຽວແລະໜາ. ນໍ້າລາຍມາຈາກປາກຂອງທ່ານ ແລະມີລັກສະນະເປັນນໍ້າແລະບາງໃສ. ຢ່າເກັບເອົານໍ້າລາຍ.

ເຄັດລັບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດໄອເອົາຂໍ້ກະເທີອອກມາໄດ້, ໃຫ້ພະຍາຍາມຫາຍໃຈສູດເອົາໄອນ້ຳຈາກຝັກບົວອາບນໍ້າຮ້ອນ ຫຼື ໝໍ້ຕົ້ມນໍ້າຮ້ອນ.

ວິທີເກັບເອົາຕົວຢ່າງຂໍ້ກະເທີ

ໝໍ ຫຼື ພະຍາບານຂອງທ່ານຈະໃຫ້ຈອກປລາສະຕິກແບບພິເສດແກ່ທ່ານສໍາລັບນໍາໃຊ້ໃນການເກັບຂໍ້ກະເທີຂອງທ່ານ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຢ່າງຮອບຄອບ:

1. ຈອກນັ້ນສະອາດຫຼາຍ. ຢ່າເປີດຈອກຈົນກວ່າທ່ານພ້ອມຈະເອົາໄປໃຊ້.
2. ທັນທີທີ່ທ່ານຕື່ນນອນໃນຕອນເຊົ້າ (ກ່ອນທ່ານກິນ ຫຼື ດື່ມຫຍັງ), ໃຫ້ຖູແຂ້ວ ແລະບ້ວນປາກດ້ວຍນໍ້າ. ຢ່າໃຊ້ນໍ້າຢາບ້ວນປາກ.
3. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ອອກໄປຂ້າງນອກ ຫຼື ເປີດປ່ອງຢ້ຽມກ່ອນທີ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງຂໍ້ກະເທີ. ມັນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຜູ້ອື່ນຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດວັນນະໂຮກໃນເວລາທ່ານໄອ.
4. ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ແລະກັ້ນຫາຍໃຈໄວ້ 5 ວິນາທີ. ແລ້ວຄ່ອຍໆ ຫາຍໃຈອອກ. ຫາຍໃຈເລິກໆ ອີກຄັ້ງ ແລະໄອອອກມາແຮງໆ ຈົນກວ່າຈະມີຂໍ້ກະເທີອອກມາໃນປາກຂອງທ່ານ.
5. ຖິ້ມຂໍ້ກະເທີໃສ່ໃນຈອກປລາສະຕິກ.
6. ໃຫ້ເຮັດແນວນີ້ໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະເກັບຕົວຢ່າງຂໍ້ກະເທີໄດ້ 5 ມລ (ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ) ໃນຈອກປລາສະຕິກ. ຈຳນວນນີ້ແມ່ນຂໍ້ກະເທີປະມານ 1 ຊ້ອນຊາ.
7. ປິດຝາຈອກໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວ.
8. ລ້າງພາຍນອກຈອກ ແລະເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ.
9. ຂຽນວັນທີທີ່ທ່ານເກັບຂໍ້ກະເທີໄວ້ເທິງຈອກ.
10. ເອົາຈອກໃສ່ໃນກ່ອງ ຫຼື ຖົງທີ່ພະຍາບານເອົາໃຫ້ທ່ານ.
11. ເອົາຈອກນັ້ນໃຫ້ແກ່ຄລິນິກ ຫຼື ພະຍາບານຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເກັບຈອກຕົວຢ່າງນັ້ນໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນຂ້າມຄືນໄດ້ ຖ້າວ່າຈຳເປັນ. ຢ່າເອົາໄວ້ໃນຊ່ອງແຊ່ແຂງ ຫຼື ຢ່າປະໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.

ດັດແປງຈາກເອກະສານຈາກກົມສາທາລະນະສຸກມິນນິໄຊຕາ, ໂຄງການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມວັນນະໂຮກ



ກົມສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານສາມາດຮັບເອົາເອກະສານນີ້ເປັນພາສາອື່ນ, ຕົວພິມຂະໜາດໃຫຍ່, ໜັງສືໂພງສໍາລັບຄົນຕາບອດ ຫຼື ໃນຮູບແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້. ຕິດຕໍ່ TB Control Program ທີ່ເບີໂທ 971-673-0169. ພວກເຮົາຍອມຮັບການໂທສໍາລັບຄົນພິການ ຫຼື ທ່ານສາມາດໂທສຫາ 711 ໄດ້.