



COVID-19 疫苗加强针常见问题解答

(2022 年 1 月 11 日更新)

问： 是否推荐 COVID-19 疫苗加强针？

是。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议所有年满 12 岁的人士在符合条件的情况下接受加强针：接种第二针辉瑞或莫德纳疫苗后五个月，或接种强生疫苗后两个月。12 - 17 岁的人士只有资格接种辉瑞疫苗。

问： 接受加强剂后是否有等待期？

是。应在接种疫苗后 15-30 分钟内监测人们的即时副作用。

问： 人们在哪里可以得到加强剂量？

加强针可以通过药房、医生诊室和诊所广泛获得，就像目前的 COVID-19 疫苗一样。请使用[疫苗定位地图](#)，寻找您附近的疫苗供应商，或拨打 211 或 866-698-6155，以获得任何语言的信息和帮助。不需要提供资格证明，但提供者可能会要求确认您最后一次接种的疫苗。

问： 加强针是如何发挥作用的？

初次接种的疫苗系列建立起免疫系统，以产生对抗疾病所需的抗体。随着时间的推移，免疫反应减弱。加强针可以加强最初的免疫反应，并且往往会产生更高的抗体水平，从而帮助人们保持更长时间的免疫力。

问： 加强剂量与其他 COVID-19 疫苗的剂量不同吗？

莫德纳加强剂量是半剂量；这意味着它是莫德纳第一或第二剂量的一半。这是唯一的不同之处。

辉瑞公司或强生公司疫苗的第一、第二或加强剂量之间没有区别。

问： 有资格接受第三剂和加强针的人是否应该同时接种这两剂？

是。[CDC 建议](#)接种第三针疫苗的免疫功能低下的人也应该接种加强针。建议免疫力低下且对初次接种系列疫苗没有强烈免疫反应的人接种第三剂辉瑞或莫德纳疫苗。第三针要在接种第二针后 28 天或更长时间内进行。然后，如果接种辉瑞或莫德纳疫苗则五个月后，因为免疫力可能已经减弱，这些人有资格接种加强针——这将是他们接种的第四针疫苗。

免疫功能低下并接受了一剂强生疫苗的人不应再接受额外的主要剂量；但他们应该在两个月后接种这三种疫苗中任何一种的加强针，以提高他们的免疫力和预防疾病的能力。

问： 提供者需要了解接种加强针后有关安全和报告方面的什么信息？

提供者应监测不良事件，包括局部和全身反应。我们鼓励提供者向疫苗不良事件报告数据库 (VAERS) 报告任何不良反应。<https://vaers.hhs.gov>

问： 俄勒冈州是否有足够的疫苗来满足这种需求？

是。您可以在方便的地点（药房、医生诊室、长期护理机构或某些地点的大规模疫苗接种诊所）获得加强针。请耐心等待。您可能需要预约。但是别担心，您现在接种的疫苗仍然能有效预防严重的 COVID-19 疾病。

问： 我已接种一剂莫德纳和一剂辉瑞疫苗。我应该接种哪种加强针？

接种了混合疫苗系列的人可以接种辉瑞或莫德纳疫苗加强针。您也可以选择接种强生疫苗。如果您有其他问题，请咨询您的医疗保健提供者。

问： 我接种了强生疫苗。如果我接种辉瑞或莫德纳的加强剂，我需要接种两剂吗？

否。加强剂量是所有三种疫苗的单一剂量，所以您只需要在接种强生公司的初始疫苗之后增加一剂疫苗：全剂量的辉瑞或强生公司，或半剂量的莫德纳。

问： 父母或监护人是否需要陪同 15 - 17 岁的孩子接种加强针疫苗？

否。根据俄勒冈州法律，年满 15 岁的未成年人可以同意接受由医生、医生助理、自然疗法医师、执业护士、牙医、验光师、或拥有此类执照的其他执业者提供的医疗，包括疫苗接种。

问： 是否需要提供疫苗接种证明才能注射加强针？

否。但是，您的提供者可能会询问您上次接种疫苗的时间，因为接种应在授权的时间段内进行。所有疫苗接种者都应检查 ALERT 系统，以确定时间是否合适。

文件可访问性：对于残障人士或说英语以外的其他语言的人，OHA 可以提供其他格式的信息，例如翻译、大号字体或盲文。通过 1-971-673-2411, 711 TTY 或者 COVID19.LanguageAccess@dhs.oha.state.or.us 联系 COVID-19 通讯部门。