



加强剂，免疫功能低下者的第三剂

(2022 年 1 月 11 日更新)

欲了解最新信息，请访问 <https://govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid-19-vaccine>

建议的加强剂

所有三种 COVID-19 疫苗也可作为以下所列人群中完全接种疫苗的人的加强剂。人们可以选择接种哪种疫苗作为加强剂，并且可以在大多数提供 COVID-19 疫苗的地点接种加强剂。

疫苗	为以下人群推荐	时机
辉瑞 (Pfizer) 第一剂 0.3 mL 第二剂 0.3 mL 加强剂 0.3 mL	<ul style="list-style-type: none"> • 年满 12 岁的人士 • 现在建议年满 12 岁，免疫功能低下并接受了第三剂的人士接种加强剂。 	第二剂后至少五个月的加强剂
莫德纳 (Moderna) 第一剂 0.5 mL 第二剂 0.5 mL 加强剂 0.25 mL	<ul style="list-style-type: none"> • 年满 18 岁的人士 • 现在建议年满 18 岁、免疫功能低下并接受了第三剂的人士接种加强剂。 	第二剂后至少五个月的加强剂
强生 (Johnson & Johnson) 第一剂 0.5 mL 加强剂 0.5 mL	<ul style="list-style-type: none"> • 年满 18 岁的人士 • 现在建议年满 18 岁、免疫功能低下并接受了强生 (Johnson & Johnson) 疫苗的人士接种加强剂。 	推荐在第一剂后至少 2 个月的加强剂

免疫功能低下人士的第三剂

如果您的免疫功能低下，您应该在接种第二剂疫苗后至少 28 天接种第三剂 mRNA 疫苗。

疫苗	为以下人群推荐	时机
辉瑞 (Pfizer) 12+ 第一剂 0.3 mL 第二剂 0.3 mL 第三剂 0.3 mL 适用于 5-11 岁儿童的剂量 第一剂 0.2 mL 第二剂 0.2 mL 第三剂 0.2 mL	免疫功能中度至重度低下 ，且易于感染 COVID-19 的年满 5 岁的人群。	第二剂后至少 28 天
莫德纳 (Moderna) 第一剂 0.5 mL 第二剂 0.5 mL 第三剂 0.5 mL	免疫功能中度至重度低下 ，且易于感染 COVID-19 的人士。	第二剂后至少 28 天
强生 (Johnson & Johnson)	强烈建议所有接种强生 (Johnson & Johnson) 疫苗的人士在接种强生 (Johnson & Johnson) 疫苗两个月后接种三种授权疫苗中的任何一种。	不适用

文件可访问性：对于残障人士或说英语以外的其他语言的人，OHA 可以提供其他格式的信息，例如翻译、大号字体或盲文。通过 1-971-673-2411, 711 TTY 或者 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us 联系 COVID-19 通讯部门。