

单克隆抗体 (mAb) 情况说明书

单克隆抗体 (mAb) 治疗有助于预防严重疾病，并降低因 COVID-19 而丧生的人数。

这种疗法现在可在全州更多的提供者处提供，使其更容易获得。

为何要接受 mAb 治疗？

- 它对于预防因 COVID-19 而导致的住院治疗非常有效，并降低 COVID-19 在暴露者中的发展。
- 它降低死亡风险。
- 它被证明对 Delta 变异体有效。

什么是单克隆抗体？

单克隆抗体 (mAb) 是实验室开发的抗体，可阻止病毒进入您的细胞并降低疾病的严重程度和住院治疗。

谁具备资格接受 mAb 治疗？

年满 12 岁，体重至少 88 磅（40 公斤）且符合以下条件的个人：

1. 已检测出 COVID-19 呈阳性

- 出现症状后 10 天内
- 有轻度至中度症状
- 未住院治疗，即可以在家接受治疗，并且没有接受氧疗
- 并且被认为是[高危患者](#)。

或

2. 曾接触过 COVID-19 或因机构环境（如疗养院）中的病例而处于高接触风险，且未完全接种疫苗且被视为[高风险](#)。在某些情况下，完全接种疫苗的人也有资格。

如我接受单克隆抗体治疗，我可以期待什么？

单克隆抗体疗法是使用针头在静脉（输液）或皮下（皮下）输注液体。您的医疗保健提供者或您将接受治疗的地点将说明您将接受哪种治疗。对于这两种操作，针头都由训练有素的医疗专业人员进行使用的。

如您未接种疫苗，您应该在治疗后等待 90 天才能接种疫苗。

接受 mAb 治疗不会改变所需的检疫隔离和隔离的持续时间。继续遵循当地卫生部门提供的指导。

输液（在静脉中）

您必须前往有经过专门培训的工作人员的输液中心，才能接受输液形式的单克隆抗体。

这种治疗是通过使用针头（静脉注射）将液体注入您的静脉。完成输注需要 20 - 50 分钟，甚至可能更长。输注后您将被要求再等一个小时，以确保您没有严重的副作用。

皮下（在皮肤下）

如您接受皮下单克隆抗体治疗，则将在皮肤下的四个不同位置使用四个短针进行注射。通常包括手臂背侧、腹部和/或大腿。接收所有四针大约需要 1-3 分钟。您将被要求在注射后等待一个小时，以确保您没有严重的副作用。

副作用

无论采用哪种治疗，您都可能在注射部位感到不适。这是很常见的，应该会在几天内消失。

有些人可能会出现轻微的反应，包括：

- 短暂的疼痛
- 轻度流血
- 淤青
- 酸痛
- 肿胀

这些类似于您通过注射获得其他药物时可能遇到的情况，例如 Covid-19 疫苗或流感疫苗。这些可能会持续几天。

如您注意到注射部位附近出现疼痛、发红、引流、麻木、刺痛或其他相关症状等变化，请致电您的医疗保健提供者。

罕见的过敏反应

这种情况很少见，但有些人可能会对单克隆抗体治疗产生严重的过敏反应。每个人都会被要求在接受治疗后至少等待一小时，以确保没有严重的过敏反应，按需可以立即提供帮助。

其他严重反应

极少数人可能会对治疗产生罕见，但严重的反应。如您在治疗后的几天内出现以下任何更严重的症状，请咨询您的医疗保健提供者或寻求医疗护理：

- 胃部不适（恶心、呕吐或腹泻）
- 瘙痒、肿胀、皮疹或荨麻疹
- 头晕或低血压
- 心跳有所变化
- 任何新的或恶化的症状
- 呼吸困难
- 虚弱
- 意思不清

不同类型的单克隆抗体治疗

Casirivimab/Imdevimab – 两种抗体的组合有助于使您的身体对 COVID-19 病毒做出反应（如检测呈阳性），或者在您接触 COVID-19 病毒时用于预防疾病。这种药物可以通过静脉输注（静脉内），或皮下注射四针进行给药。您需要在治疗后接受 1 小时的监测。

Bamlanivimab/Etesivimab – 两种抗体的组合有助于使您的身体对 COVID-19 病毒做出反应（如检测呈阳性），或者在您接触 COVID-19 病毒时用于预防疾病。这种药物只能通过静脉输注（静脉）进行给药。您需要在治疗后接受 1 小时的监测。

Sotrovimab – 一种单一抗体，有助于使您的身体对 COVID-19 病毒做出反应（如检测呈阳性）。这种药物只能通过静脉输注（静脉）进行给药。您需要在治疗后接受 1 小时的监测。

治疗后会发生什么？

治疗结束后，您应该回家休息并注意您的 COVID-19 症状（如有的话）。如注射部位感到不适，您可以在治疗当天使用冷敷。之后，暖敷（如加热垫）可以帮助治愈任何瘀伤。

大多数人不需要任何额外的后续治疗。如您的医疗保健提供者认为您应该接受额外治疗，他们会与您进行沟通。

您可能会开始感觉到您的 COVID-19 症状迅速改善，或者您可能还需要一段时间才能开始感觉好转。在某些情况下，您的 COVID-19 症状可能会恶化。如症状非常严重，您应该立即就医，包括：

- 呼吸困难
- 持续性胸痛或胸闷
- 新的意识不清
- 无法清醒或保持清醒
- 苍白、发灰或发蓝的皮肤、嘴唇或指甲（取决于肤色）。

报告严重的副作用

1. 立即告知您的医疗保健提供者
2. 在 www.fda.gov/medwatch 上，或致电

1-800-FDA-1088 或致电 1-844- 734-6643，向 FDA MedWatch 报告您的副作用。

有问题打电话给谁

如您对治疗有疑问或疑虑，请致电您的医疗保健提供者或您接受治疗的诊所或药房。

文件可访问性：对于残障人士或说英语以外的其他语言的人，OHA 可以提供其他格式的信息，例如翻译、大号字体或盲文。通过 1-971-673-2411、711 TTY 或 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us [联系 COVID-19 通信部门](#)。