

COVID-19 疫苗剂量

COVID-19 疫苗	第一剂	第二剂	第三剂	额外剂 ¹ (仅用于免疫功能低下人士)	加强剂 ²
Moderna 单价儿科初级系列 (6 个月 - 5 岁)	0.25 mL (深蓝色瓶盖, 洋红色标签边框)	0.25 mL	不适用	0.25 mL	不适用
辉瑞单价儿科初级系列 (6 个月 - 4 岁)	0.2 mL (栗色盖子)	0.2 mL	0.2 mL	不适用	不适用
辉瑞儿科初级系列 (5 - 11 岁)	0.2 mL (橙色盖子)	0.2 mL	不适用	0.2 mL	0.2 mL
Moderna 单价儿科初级系列 (6 - 11 岁)	0.5 mL (深蓝色瓶盖, 茶色或紫色标签边框)	0.5 mL	不适用	0.5 mL	不适用
辉瑞二价加强剂 (5 - 11 岁)	不适用	不适用	不适用	不适用	0.2 mL (橙色瓶盖, 橙色标签边框)
Moderna二价加强剂 (6 - 11)	不适用	不适用	不适用	不适用	0.5 mL (深蓝色瓶盖, 灰色标签边框)
辉瑞单价初级剂量 (12 岁以上)	0.3 mL (灰色盖子)	0.3 mL	不适用	0.3 mL	本制剂未被授权作为加强剂; 请参阅下面的二价加强剂选项
Moderna单价初级剂量 (12 岁以上)	0.5 mL (红色瓶盖, 浅蓝色标签边框)	0.5 mL	不适用	0.5 mL	本制剂未被授权作为加强剂; 请参阅下面的二价加强剂选项。
辉瑞公司的二价加强剂 (12岁以上)	不适用	不适用	不适用	不适用	0.3 毫升 (灰色盖子)

Moderna二价加强剂（12岁以上）	不适用	不适用	不适用	不适用	0.5 mL（深蓝色瓶盖，灰色标签边框）
强生（18岁以上）	0.5 mL	不适用	不适用	见以下说明	见以下说明
Novavax ³ （年满12岁及以上）	0.5 mL	0.5 mL	不适用	不适用	不适用

注：接种强生公司（Johnson & Johnson）疫苗的免疫力低下者应在初次接种后至少 28 天再接种一剂单价（原疫苗配方） mRNA 疫苗（辉瑞或Moderna）。然后在其额外剂量后至少两个月或在其最近的单价加强剂后至少两个月接种最新的二价（更新的疫苗配方） mRNA 疫苗的加强剂。

¹ CDC 建议免疫力低下并接受过辉瑞（5 岁及以上）或Moderna（6 个月以上）的人在第二针后至少 28 天再注射（单价）一针。免疫力低下者的额外剂量是初级系列疫苗的一部分。目前不建议为6个月至4岁的儿童注射额外剂量的辉瑞疫苗。

² CDC 建议 5 岁及以上接种辉瑞或Moderna的人士，以及 18 岁及以上接受强生的人士，在符合条件时接种二价Moderna或辉瑞加强剂 — 即，在完成初级系列后至少 2 个月（包括针对免疫功能低下者的额外剂量）或在接受最近的单价加强剂后 2 个月。

³ 目前不建议免疫力低下的人接种Novavax疫苗的额外剂量。

文件可访问性：对于残障人士或说英语以外的其他语言的人，OHA 可以提供其他格式的信息，例如翻译、大号字体或盲文。通过 971-673-2411，711 TTY 或者 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us，联系 COVID-19 通讯部门