



COVID-19 疫苗剂量

COVID-19 疫苗	第一剂	第二剂	第三剂* (仅用于免疫功能低下人士)	加强剂*
辉瑞儿童剂 (5-11岁)	0.2 mL	0.2 mL	0.2 mL	FDA 或 CDC 不推荐
辉瑞 (年满 12 岁人士)	0.3 mL	0.3 mL	0.3 mL	0.3 mL (适用于 12 岁以上人士, 接种第二剂后 5 个月)
莫德纳 (年满 18 岁人士)	0.5 mL	0.5 mL	0.5 mL	0.25 mL (适用于 18 岁以上人士, 接种第二剂后 5 个月)
强生 (J&J; 18 岁以上)	0.5 mL		FDA 或 CDC 不推荐	0.5 mL (适用于 18 岁以上人士, 接种首剂后 2 个月)

* CDC 建议所有 12 岁及以上的人在符合条件的情况下接种加强剂：在接种第二剂辉瑞或莫德纳疫苗后五个月，或接种杨森（强生）疫苗一剂后两个月。这包括免疫力低下并接种过第三剂辉瑞或莫德纳的人士。

文件可访问性：对于残障人士或说英语以外的其他语言的人，OHA 可以提供其他格式的信息，例如翻译、大号字体或盲文。通过 1-971-673-2411, 711 TTY 或者 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us 联系 COVID-19 通讯部门。