



年满 12 岁人士的加强剂速览

美国疾病控制和预防中心（CDC）建议年满 12 岁的人士都应接受 COVID-19 疫苗加强剂。

2022 年 1 月 5 日，CDC 加强了对加强剂量的建议。现在，它建议所有年满 12 岁的人在符合条件时接受加强剂量：在第二剂辉瑞或莫德纳后五个月，或在强生剂量后两个月。这包括免疫功能低下且可能已接受第三剂辉瑞或莫德纳疫苗的人。12-17 岁的人只有资格接种辉瑞疫苗。

即使是 COVID-19 严重疾病风险较低的人也应该接种加强剂以保护自己 and 他人。

加强剂将重建中和抗体，加强身体对抗突破性病例的能力。即使您并无患重病的高风险，您也有可能被感染，然后传染给其他人（例如太小而无法接种疫苗的儿童、老人或免疫功能低下的人）。

加强剂帮助人们更长时间地保持对疾病的强大免疫力。

第一个疫苗系列建立了免疫系统，以制造对抗疾病所需的抗体。随着时间的推移，免疫反应减弱。加强针可以加强最初的免疫反应，并且往往会产生更高的抗体水平，从而帮助人们保持更长时间的免疫力。

加强针能在几天内提高免疫反应。

这项研究仍在继续，但我们可以肯定地说，几天后的免疫力达到或超出主剂接种之后的免疫水平。

接受加强剂后，应监测 15-30 分钟。

就像您的主剂接种一样，应在接种疫苗后 15-30 分钟内监测其即时副作用。

加强剂在被广泛使用，但您可能需要等待一段时间。

加强针可以通过药房、医生诊室和诊所广泛获得，就像目前的 COVID-19 疫苗一样。请使用[疫苗定位地图](#)，寻找您附近的疫苗供应商，或拨打 211 或 866-698-6155，以获得任何语言的信息和帮助。不需要提供资格证明，但提供者可能会要求提供您上一剂的书面确

认。请耐心一些。正如他们在整个疫情期间所做的那样，疫苗提供者正在辛勤工作以满足需求。

年满 15 岁的人可以同意接种疫苗。

根据俄勒冈州法律，年满 15 岁的人可以同意接受由医生、医生助理、自然疗法医师、执业护士、牙医、验光师、或在这些提供者许可下运营的其他专业人士提供的医疗，包括疫苗接种。

对于某些人来说，心肌炎和心包炎可能是接种疫苗的罕见副作用。

心肌炎是心肌的一种炎症。心包炎是心脏周围内膜的炎症。在接受 COVID-19 mRNA 疫苗（莫德纳或辉瑞）后，一些患者报告了这两种情况。与女性或年长男性相比，12-39 岁男性的病例更常见。CDC 的医学研究人员对这些案例进行了研究，并确定 COVID-19 导致严重疾病的风险要比接种疫苗后患上其中一种心脏病的风险大得多。与接种疫苗相比，COVID-19 感染更可能引起心肌炎和心包炎。

加强剂量是安全的、有效的，并且是免费的。

文件可访问性：对于残障人士或说英语以外的其他语言的人，OHA 可以提供其他格式的信息，例如翻译、大号字体或盲文。通过 1-971-673-2411, 711 TTY 或者 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us 联系 COVID-19 通讯部门。