

您需要了解的内容

关于治疗潜伏性结核 (TB) 感染的药物

RIFAMPIN

您已经被给予治疗潜伏性结核感染的药物。您没有患结核病,也不会将结核病传染给其他人。服药是为了**预防**您患结核病。

在服药期间:

- 如果您对该药物有任何疑问或担忧, 请告诉您的医生或护士。
- 前往诊所就诊。
- 与您的医生或护士讨论任何饮酒情况。服药期间最好不要饮酒。
- 告诉您的医生或护士您正在服用的所有其他药物。
- 请一定要告诉您的其他医生您正在接受潜伏性结核感染治疗。
- 按照您的结核医生或护士的嘱咐, 服用所有药物。
- 有人发现, 随饭服用药物效果更好。

服药小贴士:

- ✓ 每天在同一时间服用药物。
- ✓ 就您应该服药的时间设置闹钟提醒。
- ✓ 请家人或朋友提醒您。
- ✓ 使用药盒。
- ✓ 在镜子或冰箱上贴上提醒字条。
- ✓ 使用日历, 将已经服药的日子划掉。

潜伏性结核感染药物时间表:

(提供者: 指明服药的适当数量)

药物	时间表	每天服药数量	时间长度
Rifampin	每天		4 个月

如果您忘了服药: 如果仍然是同一天, 请在记得时尽快服用。
不要同时服用两剂。

备注

我的医生的姓名:

我的诊所名称:

我的诊所电话号码:

本文件可应要求以适合残疾人的其他格式提供或针对英语能力有限的人以英语以外的其他语言提供。如若需要本文件以其他格式或语言提供, 请致电 971-673-0174, 联系结核病管制部。



注意这些可能的问题:

如果您有以下任何问题, 立即停止服药, 并致电您的结核医生或护士:

- 食欲不振或没有食欲
- 胃部不适或胃痉挛
- 恶心或呕吐
- 可乐色尿液或轻度腹泻
- 容易瘀伤或出血
- 皮疹或瘙痒
- 皮肤或眼睛发黄
- 严重虚弱或疲倦
- 发烧
- 头痛或身体疼痛
- 头晕

注意: 如果您的尿液、唾液或眼泪变成橙色, 这是正常现象。软式隐形眼镜可能会变脏。

Oregon
Health
Authority

公共卫生部门
卫生系统转型