



# Perguntas Frequentes sobre a dose de reforço contra a COVID-19

(Atualização de 11/01/2022)

## P: As doses de reforço da vacina contra a COVID-19 são recomendadas?

Sim. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomendam que todas as pessoas com 12 anos ou mais recebam uma dose de reforço assim que forem elegíveis: seis meses após a segunda dose da Pfizer ou Moderna, ou dois meses após uma dose da Johnson & Johnson. As pessoas dos 12 aos 17 anos de idade são elegíveis apenas para receber a vacina da Pfizer.

## P: Existe um período de espera após receber uma dose de reforço?

Sim. As pessoas devem ser monitorizadas quanto a efeitos secundários imediatos durante 15-30 minutos após a vacinação.

## P: Onde é que as pessoas podem ir para levar uma dose de reforço?

Há grande disponibilidade de doses de reforço em farmácias, consultórios médicos e clínicas, como ocorre atualmente com a vacina contra a COVID-19. Use o [mapa do localizador de vacina](#) para encontrar um fornecedor de vacina próximo de si ou telefone para 211 ou 866-698-6155 para obter informações e assistência em qualquer idioma. Não é exigida prova de elegibilidade, embora os prestadores possam solicitar uma confirmação da sua última dose.

## P: Como funciona a dose de reforço?

A primeira série de vacinas preparou o sistema imunitário para produzir os anticorpos necessários para combater a doença. Com o tempo, a resposta imunitária enfraquece. Uma dose de reforço reforça a resposta inicial e tende a resultar em níveis mais elevados de anticorpos que ajudam as pessoas a manter a sua imunidade durante mais tempo.

## P: A dose de reforço é diferente das outras doses das vacinas contra a COVID-19?

A dose de reforço da Moderna é uma meia dose; isto significa que é metade da quantidade da primeira ou segunda doses da Moderna. Essa é a única diferença.

Não há diferença entre a primeira dose, segunda dose ou dose de reforço para as vacinas da Pfizer ou da Johnson & Johnson.

**P: Alguém que é elegível para uma terceira dose e uma dose de reforço deve receber ambas?**

Sim. O [CDC recomenda](#) que as pessoas imunocomprometidas que receberam uma terceira dose devem também receber uma dose de reforço. Uma terceira dose de vacina, seja Pfizer ou Moderna, é recomendada a pessoas imunocomprometidas e que não experimentaram uma forte resposta imunológica à respetiva série de vacinas preliminares. A terceira dose deve ser dada 28 dias, ou mais, após a segunda dose. Portanto, seis meses depois no caso da vacina da Moderna ou cinco meses depois no caso da vacina da Pfizer, pois a imunidade pode ter diminuído, estas pessoas são elegíveis para uma dose de reforço - que será a sua quarta dose.

As pessoas imunocomprometidas e que tenham recebido uma dose da Johnson & Johnson como série principal não devem receber uma dose inicial adicional: devem ser vacinadas dois meses mais tarde com uma dose de reforço de qualquer uma das três vacinas para aumentar a imunidade e a proteção contra a doença.

**P: O que os fornecedores têm de saber sobre segurança e comunicação após a administração de uma dose de reforço?**

Os profissionais de saúde devem monitorizar os acontecimentos adversos, incluindo reações locais e sistémicas. Os fornecedores são incentivados a reportar quaisquer reações adversas à Base de Dados de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas (Vaccine Adverse Events Reporting Database, VAERS). <https://vaers.hhs.gov>

**P: Haverá vacinas suficientes disponíveis no Oregon para satisfazer a procura?**

Sim. Poderá obter uma dose de reforço num local conveniente (farmácia, consultório médico, unidade de tratamento de longo prazo ou instalações de vacinação em massa em alguns locais). Seja paciente. Poderá ser necessário fazer o agendamento. Não se preocupe, a sua vacinação atual continua a proporcionar forte proteção, evitando casos graves da COVID-19.

**P: Recebi uma dose da Moderna e uma dose da Pfizer. Que dose de reforço devo receber?**

As pessoas que receberam séries de doses mistas podem receber um reforço ou da Pfizer ou da Moderna. Também pode optar por receber uma dose da vacina da Johnson & Johnson. Fale com o seu prestador de cuidados de saúde se tiver preocupações adicionais.

**P. Recebi a vacina da Johnson & Johnson. Se levar uma dose de reforço da Pfizer ou da Moderna, preciso de duas doses?**

Não. Uma dose de reforço é uma dose única para todas as três vacinas, por isso, precisa apenas de uma dose adicional da vacina depois da vacina primária da Johnson & Johnson: dose completa da Pfizer ou da Johnson & Johnson, ou uma meia dose da Moderna.

**P: Um progenitor ou tutor precisa de acompanhar um adolescente de 15 a 17 anos para receber a dose de reforço?**

Não. Nos termos da lei do Oregon, os menores de 15 anos ou mais podem dar o seu consentimento para receber tratamento médico, incluindo vacinas, quando fornecido por um(a) médico(a), assistente médico(a), naturopata, enfermeiro(a) clínico(a), dentista ou optometrista, ou outros profissionais de saúde que trabalhem ao abrigo da licença destes prestadores.

**P: Essas pessoas têm de apresentar cupão de vacinação para receber uma dose de reforço?**

Não. No entanto, o seu prestador pode perguntar-lhe quando recebeu a sua última vacinação, uma vez que a administração deve ser feita dentro do período de tempo autorizado. Todos os profissionais de vacinação devem verificar o sistema de ALERTA para determinar se o momento é adequado.

**Acessibilidade do documento:** Para indivíduos com incapacidades ou indivíduos que falem outra língua que não inglês, a OHA pode fornecer informação em formatos alternativos, como traduções, impressão de maiores dimensões ou braille. Contacte a Unidade de Comunicações da COVID-19 (COVID-19 Communications Unit) através do número de telefone 1-971-673-2411, 711 TTY ou [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us).