



Doses de reforço, terceiras doses para as pessoas

imunocomprometidas

(Atualização de 11/01/2022)

Para obter a informação mais atualizada, visite <https://govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid-19-vaccine>

Doses de reforço recomendadas

As três vacinas contra a COVID-19 estão também disponíveis sob a forma de dose de reforço para as pessoas com a vacinação completa nos grupos listados abaixo. As pessoas podem escolher qual a vacina a receber como reforço e podem receber uma dose de reforço na maioria dos locais que administram vacinas contra a COVID-19.

Vacina	Recomendada para os seguintes grupos de pessoas	Momento da administração
Pfizer Primeira dose 0,3 ml Segunda dose 0,3 ml Dose de reforço 0,3 ml	<ul style="list-style-type: none"> idade igual ou superior a 12 anos Dose de reforço agora recomendada para pessoas com 12 anos ou mais que são imunocomprometidas e receberam uma terceira dose. 	A dose de reforço será administrada pelo menos cinco meses após a segunda dose
Moderna Primeira dose 0,5 ml Segunda dose 0,5 ml Dose de reforço 0,25 ml	<ul style="list-style-type: none"> idade igual ou superior a 18 anos Dose de reforço agora recomendada para pessoas com 18 anos ou mais que são imunocomprometidas e receberam uma terceira dose. 	A dose de reforço será administrada pelo menos cinco meses após a segunda dose
Johnson & Johnson Primeira dose 0,5 ml Dose de reforço 0,5 ml	<ul style="list-style-type: none"> idade igual ou superior a 18 anos Dose de reforço agora recomendada para pessoas com 18 anos ou mais que 	A dose de reforço é recomendada pelo menos

	são imunocomprometidas e receberam uma vacina da Johnson & Johnson.	2 meses após a primeira dose
--	---	------------------------------

Terceiras doses para pessoas imunocomprometidas

Se tiver um compromisso imunitário, deve levar uma terceira dose de vacina de mRNA pelo menos 28 dias após a sua segunda dose.

Vacina	Recomendada para os seguintes grupos de pessoas	Momento da administração
Pfizer 12+ Primeira dose 0,3 ml Segunda dose 0,3 ml Terceira dose 0,3 ml Dose pediátrica para 5-11 anos de idade Primeira dose 0,2 ml Segunda dose 0,2 ml Terceira dose 0,2 ml	Pessoas a partir de 5 anos que tenham compromisso imunitário moderado a grave , que sejam particularmente vulneráveis à COVID-19.	Pelo menos 28 dias após a segunda dose
Moderna Primeira dose 0,5 ml Segunda dose 0,5 ml Terceira dose 0,5 ml	Pessoas com compromisso imunitário moderado a grave , que sejam particularmente vulneráveis à COVID-19.	Pelo menos 28 dias após a segunda dose
Johnson & Johnson	Todas as pessoas que receberam uma vacina da Johnson & Johnson são fortemente aconselhadas a receber uma dose de reforço de qualquer uma das três vacinas autorizadas dois meses após a dose da Johnson & Johnson.	Não se aplica

Acessibilidade do documento: Para indivíduos com incapacidades ou indivíduos que falem outra língua que não inglês, a OHA pode fornecer informação em formatos alternativos, como traduções, impressão de maiores dimensões ou braille. Contacte a Unidade de Comunicações da COVID-19 (COVID-19 Communications Unit) através do número de telefone 1-971-673-2411, 711 TTY ou COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us.