



Дозы вакцины против COVID-19

Вакцина против COVID-19	Первая доза	Вторая доза	Третья доза* (только для лиц с ослабленным иммунитетом)	Бустерная доза*
Вакцина компании Pfizer для детей (в возрасте 5–11 лет)	0,2 мл	0,2 мл	0,2 мл	Не рекомендовано FDA или CDC
Вакцина компании Pfizer (для лиц в возрасте 12 лет и старше)	0,3 мл	0,3 мл	0,3 мл	0,3 мл (для лиц в возрасте 12 лет и старше, через пять месяцев после второй дозы)
Вакцина компании Moderna (для лиц в возрасте 18 лет и старше)	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл	0,25 мл (для лиц в возрасте 18 лет и старше, через пять месяцев после второй дозы)
Вакцина компании Janssen (Johnson & Johnson; для лиц в возрасте 18 лет и старше)	0,5 мл		Не рекомендовано FDA или CDC	0,5 мл (для лиц в возрасте 18 лет и старше, через два месяца после первой дозы)

* CDC рекомендует всем лицам в возрасте 12 лет и старше пройти вакцинацию бустерной дозой, как только они будут соответствовать критериям: через пять месяцев после введения второй дозы вакцины компании Pfizer или Moderna, или через два месяца после введения дозы вакцины компании Janssen (Johnson & Johnson). Это относится к людям с ослабленным иммунитетом, которым сделали прививку третьей дозой вакцины компании Pfizer или компании Moderna.

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих на языке, отличном от английского, ОНА может предоставить информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Обратитесь в информационный центр по борьбе с COVID-19 по номерам телефонов 1-971-673-2411, 711 ТТУ или по адресу электронной почты COVID19.LanguageAccess@dhs.ohio.gov.