

Stop Pertussis!



В. Что такое коклюш?

Коклюш — тяжелое респираторное заболевание, это вызвано бактериями. Это часто приводит к серьезным проблемам у младенцев, например пневмонии, проблемам с сердцем, кровоизлияниям в мозг и даже смерти.

Заболевание легко передается от человека к человеку. Инфицированные люди наиболее заразны на самых ранних стадиях заболевания до 2 недель после начала кашля. Время между инфекцией коклюшем и началом симптомов обычно составляет от 7 до 10 дней, но может достигать 21 дня.



В. Кто может болеть коклюшем?

Коклюш может возникнуть в любом возрасте, но младенцы и дети младшего возраста подвергаются наибольшему риску серьезного заболевания. В штате Орегон многие случаи коклюша возникают у новорожденных, которые слишком малы для иммунизации.



В. Какие симптомы коклюша?

- Первые симптомы — насморк, чихание, легкая лихорадка и кашель — обычно появляются через 5–21 день после инфекции человека.
- Через одну-две недели кашель усиливается, часто бывают сильные приступы кашля. Это может длиться шесть недель или дольше.
- Для детей приступы кашля часто сопровождаются свистящим звуком, когда они пытаются отдышаться.
- После кашля инфицированным людям может быть трудно отдышаться. Их может тошнить или они могут посинеть от нехватки воздуха.
- Приступы кашля могут быть такими сильными, что младенцам трудно есть, пить или дышать.



В. Как распространяется коклюш?

- Бактерии в носу, рту и горле распыляются в воздух, когда инфицированный человек чихает, кашляет или разговаривает.
- Прикосновение к использованной салфетке или совместному использованию чашки также может привести к распространению заболевания
- Взрослый человек с легким заболеванием может передать заболевание младенцам и маленьким детям, вызывая у них тяжелое заболевание.



В. Коклюш — это опасно?

- Коклюш может быть очень опасен для младенцев. Младенцы в возрасте до одного года имеют самый высокий риск осложнений коклюша и смерти.

В. Как диагностируется коклюш?

Врач может диагностировать коклюш на основании симптомов и лабораторных анализов.

В. Как лечится заболевание?

Коклюш лечится лекарствами, назначенными врачом.

В. Как я могу предотвратить коклюш?

- Иммунизация – лучший способ предотвратить коклюш.
- Младенцев можно начинать защищать прививкой в возрасте 2 месяцев. Чтобы полностью защитить их, они должны получить еще 4 дозы коклюшной прививки в течение следующих нескольких лет.
- Иммунитет ослабевает, поэтому подросткам и взрослым нужна бустерная прививка Tdap. Это помогает защитить подростков и взрослых от заражения коклюшем и передачи его уязвимым младенцам.
- Беременные женщины должны спросить своего лечащего врача о получении бустерной дозы Tdap. Это поможет защитить их младенцев от коклюша.
- Прикрывайтесь кашлем и мойте руки.
- Держите младенцев подальше от тех, кто кашляет.

В. Безопасна ли прививка против коклюша?

Да, вакцина безопасна и помогает предотвратить распространение коклюша. Может быть боль или припухлость в месте инъекции или лихорадка, но риск заболевания гораздо выше.

В. Есть ли коклюш в Орегоне?

Да. Мы видим вспышки коклюша каждые несколько лет. В 2012 году в Орегоне была эпидемия коклюша, наибольшее количество случаев было зафиксированных с 1953 года.

В. Где я могу найти дополнительную информацию?

- Спросите своего поставщика медицинских услуг, обратитесь в местный отдел здравоохранения или посетите веб-сайт Орегонской программы иммунизации по адресу www.healthoregon.org/imm.
- Чтобы узнать, где получить прививку против коклюша, позвоните в SafeNet по номеру 211.

Document accessibility: For individuals with disabilities or individuals who speak a language other than English, OHA can provide information in alternate formats such as translations, large print, or braille. Contact the COVID-19 Communications Unit at 1-971-673-2411, 711 TTY or COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us.