



Dosis de refuerzo, terceras dosis para personas inmunocomprometidas

(Actualizado el 01-11-2022)

Para obtener la información más actualizada, visite <https://govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid-19-vaccine>

Dosis de refuerzo recomendadas

Las tres vacunas contra el COVID-19 también están disponibles como dosis de refuerzo para personas completamente vacunadas en los grupos que se enumeran a continuación. Las personas pueden elegir qué vacuna recibir como dosis de refuerzo y pueden recibir una dosis de refuerzo en la mayoría de las ubicaciones que brindan vacunas contra el COVID-19.

Vacuna	Recomendada para los siguientes grupos de personas	Momento para recibirla
Pfizer Primera dosis: 0.3 ml Segunda dosis: 0.3 ml Dosis de refuerzo: 0.3 ml	<ul style="list-style-type: none"> Personas de 12 años o mayores La dosis de refuerzo ahora se recomienda para personas de 12 años o mayores que están inmunocomprometidas y recibieron una tercera dosis. 	Dosis de refuerzo al menos cinco meses después de la segunda dosis
Moderna Primera dosis: 0.5 ml Segunda dosis: 0.5 ml Dosis de refuerzo: 0.25 ml	<ul style="list-style-type: none"> Personas de 18 años o mayores La dosis de refuerzo ahora se recomienda para personas de 18 años o mayores que están inmunocomprometidas y recibieron una tercera dosis. 	Dosis de refuerzo al menos cinco meses después de la segunda dosis
Johnson & Johnson Primera dosis: 0.5 ml Dosis de refuerzo: 0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> Personas de 18 años o mayores La dosis de refuerzo ahora se recomienda para personas de 18 años o mayores que están inmunocomprometidas y recibieron una vacuna de Johnson & Johnson. 	Dosis de refuerzo recomendada al menos 2 meses después de la primera dosis

Terceras dosis para personas inmunocomprometidas

Si es una persona inmunocomprometida, debe recibir una tercera dosis de la vacuna de ARM mensajero al menos 28 días después de la segunda dosis.

Vacuna	Recomendada para los siguientes grupos de personas	Momento para recibirla
Pfizer Mayores de 12 años Primera dosis: 0.3 ml Segunda dosis: 0.3 ml Tercera dosis: 0.3 ml Dosis pediátrica para niños de 5 a 11 años Primera dosis: 0.2 ml Segunda dosis: 0.2 ml Tercera dosis: 0.2 ml	Personas de 5 años o mayores que están inmunocomprometidas de forma moderada o grave y que sean especialmente vulnerables al COVID-19.	Al menos 28 días después de la segunda dosis
Moderna Primera dosis: 0.5 ml Segunda dosis: 0.5 ml Tercera dosis: 0.5 ml	Personas que están inmunocomprometidas de forma moderada o grave que sean especialmente vulnerables al COVID-19.	Al menos 28 días después de la segunda dosis
Johnson & Johnson	Se recomienda enfáticamente a todas las personas que recibieron una vacuna de Johnson & Johnson a que reciban una dosis de refuerzo de cualquiera de las tres vacunas autorizadas dos meses después de la dosis de Johnson & Johnson.	N/C

Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o las personas que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (OHA) puede proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con la unidad de comunicaciones del COVID-19 al 1-971-673-2411, TTY: 711, o por correo electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhs.oha.state.or.us.