

Dosis de la vacuna contra el COVID-19

Vacuna contra el COVID-19	Primera dosis	Segunda dosis	Tercera dosis	Dosis adicional ¹ (solo para personas inmunocomprometidas)	Dosis de refuerzo ²
Serie primaria de pediátrica monovalente de Moderna (de 6 meses a 5 años)	0.25 ml (tapa color azul oscuro, borde de etiqueta color magenta)	0.25 ml	N/C	0.25 ml	N/C
Serie primaria de pediátrica monovalente de Pfizer (de 6 meses a 4 años)	0.2 ml (tapa color granate)	0.2 ml	0.2 ml	N/C	N/C
Serie primaria de pediátrica de Pfizer (de 5 a 11 años)	0.2 ml (tapa color naranja)	0.2 ml	N/C	0.2 ml	0.2 ml
Serie primaria de pediátrica monovalente de Moderna (de 6 a 11 años)	0.5 ml (tapa color azul oscuro, borde de etiqueta color turquesa o morado)	0.5 ml	N/C	0.5 ml	N/C
Dosis de refuerzo bivalente de Pfizer (de 5 a 11 años)	N/C	N/C	N/C	N/C	0.2 ml (tapa color naranja, borde de etiqueta color naranja)
Dosis de refuerzo bivalente de Moderna (de 6 a 11 años)	N/C	N/C	N/C	N/C	0.5 ml (tapa color azul oscuro, borde de etiqueta color gris)
Dosis primaria monovalente de Pfizer (mayores de 12 años)	0.3 ml (tapa color gris)	0.3 ml	N/C	0.3 ml	Esta fórmula no está autorizada como dosis de refuerzo. Consultar a continuación las opciones de dosis de refuerzo bivalente.

Dosis primaria monovalente de Moderna (mayores de 12 años)	0.5 ml (tapa color rojo, borde de etiqueta color azul claro)	0.5 ml	N/C	0.5 ml	Esta fórmula no está autorizada como dosis de refuerzo. Consultar a continuación las opciones de dosis de refuerzo bivalente.
Dosis de refuerzo bivalente de Pfizer (mayores de 12 años)	N/C	N/C	N/C	N/C	0.3 ml (tapa color gris)
Dosis de refuerzo bivalente de Moderna (mayores de 12 años)	N/C	N/C	N/C	N/C	0.5 ml (tapa color azul oscuro, borde de etiqueta color gris)
Johnson & Johnson (mayores de 18 años)	0.5 ml	N/C	N/C	Consultar la nota a continuación	Consultar la nota a continuación
Novavax³ (mayores de 12 años)	0.5 ml	0.5 ml	N/C	N/C	N/C

Nota: Las personas inmunocomprometidas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson deben recibir una dosis adicional de una vacuna monovalente (fórmula de vacuna original) con ARNm (Pfizer o Moderna) al menos 28 días después de la dosis inicial. Luego una dosis de refuerzo de una vacuna bivalente (fórmula actualizada de la vacuna) con ARNm al menos dos meses después de la dosis adicional O al menos dos meses después de la dosis de refuerzo monovalente más reciente.

¹ Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan a las personas que están inmunocomprometidas que reciban una dosis adicional de la vacuna (monovalente) de Pfizer (mayores de 5 años) o Moderna (mayores de 6 meses) al menos 28 días después de la segunda dosis. La dosis adicional para personas inmunocomprometidas es parte de la serie primaria de vacunas. En este momento, no se recomiendan dosis adicionales de la vacuna de Pfizer para niños de 6 meses a 4 años de edad.

² Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todas las personas de 5 años y mayores que recibieron Pfizer o Moderna, y que todas las personas de 18 años y mayores que recibieron Johnson & Johnson, reciban una dosis de refuerzo bivalente de la vacuna de Moderna o Pfizer cuando sean elegibles, es decir, al menos 2 meses después de completar la serie primaria (incluidas las dosis adicionales que se indican a las personas que están inmunocomprometidas) o 2 meses después de la dosis de refuerzo monovalente más reciente.

³ Actualmente, no se recomiendan dosis adicionales para personas inmunocomprometidas que reciben la vacuna Novavax.

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las personas que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (OHA) puede proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con la Unidad de comunicaciones del COVID-19 al 971-673-2411, TTY 711, o por correo electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us.