

Lo que usted necesita saber

sobre sus medicamentos para la infección latente de tuberculosis (TB)

ISONIAZID y RIFAPENTINE

Le han dado un medicamento para tratar su infección latente de TB. Usted no sufre de TB ni puede transmitirla a otras personas. Dicho medicamento **PREVIENE** la tuberculosis.

Mientras tome el medicamento:

- ✓ Hable con el médico o la enfermera si tiene preguntas o inquietudes sobre el medicamento.
- ✓ No falte a las visitas semanales.
- ✓ Informe al médico o a la enfermera si consume bebidas alcohólicas. Le recomendamos que no consuma alcohol mientras toma este medicamento.
- ✓ Informe al médico o a la enfermera sobre cualquier otro medicamento que tome.
- ✓ Asegúrese de informarles a sus otros médicos que está recibiendo tratamiento para la infección latente de TB.
- ✓ Algunas personas prefieren tomar el medicamento con alimentos.

Sugerencias para ayudarle a tomar su medicamento:

- ✓ Tome el medicamento a la misma hora cada semana.
- ✓ Programe una alarma para que le indique el día y la hora en que debe tomar el medicamento.
- ✓ Pídale a un familiar o amigo que le haga recordar.
- ✓ Use un pastillero.
- ✓ Coloque una notita en su espejo o refrigerador.
- ✓ Use un calendario y vaya tachando los días que toma el medicamento.

Programa del medicamento para la infección latente de TB:

(Proveedores: Indiquen el día y el número de pastillas que correspondan)

Medicamento	Horario	Días	No. de pastillas	Intervalo de tiempo
Isoniazid y Rifapentine	Una vez por semana	L M Mi J V S D		3 meses (12 semanas)

Su médico podría indicarle que tome B6 con el medicamento.

Notas

Nombre del médico:

Nombre de la clínica:

Número de teléfono de la clínica:

Este documento puede entregarse, a solicitud del consumidor, en un formato alternativo para individuos con discapacidades o en un idioma distinto al inglés, para personas con conocimiento limitado del inglés. Para solicitar este documento en otro formato o idioma, comuníquese con TB Control al 971-673-0174.



Esté alerta a estos posibles problemas:

DEJE de tomar el medicamento **Y** llame a su médico o enfermero(a) de TB de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes problemas:

- Pérdida de apetito o falta de hambre
- Malestar estomacal o retortijones
- Fiebre
- Dolor de cabeza o en el cuerpo
- Náuseas o vómitos
- Orina color refresco de cola o heces de color claro
- Se amorata o sangra con facilidad
- Salpullido o comezón
- Color amarillento en la piel o los ojos
- Debilidad o cansancio severos
- Hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies
- Mareos

NOTA: Es normal que la orina, la saliva o las lágrimas se vuelvan anaranjadas. Los lentes de contacto blandos podrían mancharse.

Oregon
Health
Authority

DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Health System Transformation
(Transformación del sistema sanitario)