


Vắc xin COVID-19

Triệu chứng thường gặp sau khi tiêm



Sau khi tiêm vắc xin COVID-19, quý vị có thể bị tác dụng phụ. Điều này thường có nghĩa là vắc xin đang có tác dụng để giữ cho cơ thể quý vị khỏe mạnh. Nếu quý vị cảm thấy khỏe trong ngày thì cũng không sao cả! Vắc xin vẫn đang hoạt động, ngay cả khi quý vị không bị tác dụng phụ.



Tác dụng phụ



Đau cánh tay



Mệt mỏi



Đau đầu



Sốt hoặc ớn lạnh (ít gặp hơn)



Đau cơ hoặc đau nhức



Khó thở

Cần làm gì?



Di chuyển cánh tay của quý vị!
Chườm một túi đá.



Nghỉ ngơi khi cần thiết.



Hãy thư giãn, uống thuốc giảm đau.
Nếu sốt 102° trở lên, hãy gọi cho bác sĩ để được tư vấn.



Uống thuốc giảm đau nếu cần. Quý vị cũng có thể sử dụng túi giữ nhiệt hoặc túi đá.



Gọi 911 để được trợ giúp.

Hầu hết các tác dụng phụ này sẽ biến mất sau vài ngày.



covidvaccine.oregon.gov



Soạn tin nhắn với nội dung
ORCOVID gửi 898211



Gọi 211