

# Những điều quý vị cần biết

về thuốc trị nhiễm lao tiềm ẩn (TB) của quý vị

## ISONIAZID

Quý vị đã được cho thuốc uống để trị nhiễm lao tiềm ẩn. Quý vị không bị bệnh lao và không thể lây lan bệnh lao sang người khác. Thuốc này là để **PHÒNG NGỪA** quý vị khỏi bị nhiễm bệnh lao.

### Trong lúc dùng thuốc này:

- Hãy cho bác sĩ hoặc y tá của quý vị biết nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại về thuốc.
- Giữ các buổi hẹn khám.
- Tham khảo với bác sĩ/y tá nếu quý vị có dùng bia rượu. Tốt nhất là không uống bia rượu trong khi dùng thuốc này.
- Cho bác sĩ/y tá của quý vị biết về tất cả các loại thuốc mà quý vị đang dùng.
- Đừng quên báo cho bác sĩ khác của quý vị biết rằng quý vị đang được điều trị nhiễm lao tiềm ẩn.
- Uống tất cả các loại thuốc theo lời bác sĩ/y tá trị TB của quý vị.
- Một số người cho rằng thuốc này dễ uống hơn với thức ăn.

### Một số lời khuyên giúp quý vị uống thuốc:

- ✓ Uống thuốc vào cùng một giờ mỗi ngày.
- ✓ Thiết lập chuông báo nhắc quý vị khi đến giờ uống thuốc.
- ✓ Nhờ người nhà hay một người bạn nhắc quý vị.
- ✓ Sử dụng một hộp thuốc.
- ✓ Dán giấy ghi chú nhắc nhở trên gương hoặc tủ lạnh.
- ✓ Dùng lịch để đánh dấu những ngày quý vị cần uống thuốc.

### Lịch uống thuốc nhiễm lao tiềm ẩn:

(Chuyên gia y tế: Cho biết lịch uống thuốc, ngày uống và số lượng viên thuốc phù hợp)

Thuốc	Lịch trình	Ngày	Số viên thuốc cần uống mỗi ngày	Trong bao lâu
Isoniazid	Hàng ngày	Mỗi ngày		9 tháng

Bác sĩ có thể sẽ cho quý vị uống vitamin B6 cùng với thuốc này.

**NẾU QUÝ VỊ QUÊN UỐNG THUỐC:** Nếu vẫn còn trong ngày, uống liều thuốc cho ngày đó ngay khi quý vị nhớ. Nếu đã qua ngày, đừng uống liều thuốc đã bỏ lỡ, thay vào đó uống liều kế tiếp theo lịch biểu - đừng uống 2 liều cùng một lúc.

### Ghi chú

Tên bác sĩ của tôi:

Tên phòng khám của tôi:

Số điện thoại phòng khám của tôi:



Theo dõi những vấn đề có thể xảy ra sau đây:

**NGỪNG** uống thuốc ngay **VÀ** gọi bác sĩ/y tá phụ trách bệnh lao (TB) nếu quý vị gặp bất cứ vấn đề nào sau đây:

- Ít thèm ăn hoặc không muốn ăn
- Đau bụng hoặc bụng bị co thắt
- Buồn nôn hoặc nôn mửa
- Nước tiểu màu cola hoặc đi cầu ít phân
- Phát ban hoặc ngứa
- Vàng da hay mắt
- Rần rần/tê ở bàn tay hoặc bàn chân

Tài liệu này có thể được cung cấp theo yêu cầu bằng định dạng dành cho người khuyết tật hoặc bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh cho người không thông thạo tiếng Anh. Để yêu cầu ấn phẩm này bằng định dạng hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng gọi số 971-673-0174.

Oregon  
Health  
Authority

SỞ Y TẾ CÔNG  
Chuyển đổi Hệ thống Y tế